Raising Kaninchen

VITA 1600 Wilson Boulevard, Zimmerflucht 500, Arlington, Virginia 22209 USA TEL: 703/276-1800 * FAX: 703/243-1865 Internet: pr-info@vita.org (mailto:pr-info@vita.org)

[C] 1977 Freiwillige in Technischer Hilfe ISBN 0-86619-060-0

PREFACE

Dieses Handbuch präsentiert einen Überblick des ganzen Prozesses von die Hochziehen von Kaninchen-- vom Auswählen von gesunden Tieren zum Vorbereiten richtige Essen zum Behandeln von Krankheit. EIN getrennter Teil vom Handbuch schließt Verfahren schrittweise für ein das Konstruktion einer Stall-Einheit, zwei unterzubringen macht und ein Bock.

Das Hochziehen von Kaninchen wird in klarer aufrichtiger Sprache geschrieben. Es spiegelt VITA 's Betonung auf dem Vorbereiten von Material, das kann, wider würde leicht von Vergrößerung-Arbeitern und Heimwerkern benutzt ohne Rücksicht auf kulturellem Kontext oder geographischer Lage. Das Autor und Illustratoren, die alle VITA Volunteers mit beträchtlich sind, Fähigkeit in ihren Gebieten von Sachverstand.

Harlan Attfield, der Autor, ist ein VITA Volunteer, der jetzt ist, das Arbeiten in einem innovatorischen einheitlichen Landwirtschaft-Programm in Bangladesch mit Internationalen Freiwilligen Diensten, AG , den Er hat, über zehn Jahre erfahren in tropischer Landwirtschaft und haben diente in Nigeria, Äthiopien und Mauritius. Small Vorrat und Bienenhaltung ist unter seinen Spezialitäten.

Attfield hat über 30 Artikel und Bücher geschrieben, die seines detaillieren, Erfahrungen, und hat besondere Betonung auf wirksam gesetzt Kommunikation mit Vergrößerung-Arbeitern. VITA wird bald verteilen einige des Materials, die vom Bangladesch Programm produziert werden, als Technische Bulletins.

Catharine S. Roache, ein VITA Volunteer acht Jahre, ist ein Autor und Illustrator von den Büchern von Kindern, sowie ein Dichter. Außerdem hat sie besonderes Interesse und Verwicklung im Arbeiten mit älteren Bürgern und College-Studenten.

George R. Clark ist Lehrer im Entwerfen und entwirft bei Kellogg Gemeinde College. Clark ist ein VITA Volunteer gewesen über acht Jahre und hat technische Zeichnungen beigetragen und Sachverstand zu einer Anzahl von VITA Veröffentlichungen und Projekten.

Eine besondere Notiz von Dank geht zu Jeff Cox, Kollege-Redakteur, Organische Gartenarbeit und das Bebauen von Zeitschrift, die Änderung bereitstellte, Unterstützung in seiner Rolle als ein VITA Volunteer und zu Jerome D. Belanger, Redakteur und Verleger von Landschaft-Zeitschrift der überprüfte dieses Handbuch für technischen Inhalt.

Tisch von Inhalten

TEILEN SIE 1

1 Einführung

2, die vorbereiten, Rabbits zu heben,

3, die sich für Rabbits sorgen,

4 Zucht Rabbits

5 bleibende Records

6 Kaninchen-Krankheiten und Ihre Control

7 Tötung, beim Abziehen, und das Bräunen von Rabbits

TEILEN SIE 2

Stall-Konstruktion-

Holz Stall mit Metall Roof

Holz und Bambus Hutch

Wurm-Landwirtschaft

Part 1

<ZAHL; 1>

1 Einführung

Das Hochziehen von Kaninchen ist in Europa und Norden sehr populär America. In England über eine Million Familien haben rabbits. In Amerika, Leute essen 30 Million Pfund von Kaninchen-Fleisch jedes Jahr.

Es gibt eine Anzahl von Gründen, warum das Hochziehen von Kaninchen ist, werdend ein immer mehr wichtige Aktivität überall ins Welt:

* Rabbits kann große Mengen von köstlich produzieren Fleisch. Obwohl Kaninchen-Fleisch fester ist, schmeckt es sehr wie chicken. Rabbit enthält Fleisch ein Los von Protein und ist in Kalorien und Fett niedrig. , Damit Kaninchen-Fleisch

beide gut zu essen ist und ist, ein genau gesundes Essen.

* Rabbits vervielfachen schnell. EINE Kaninchen-raiser-Dose beginnen mit zwei Frauen und einem männlich und Produkt fünfzig, oder mehr, Kaninchen in einem year. Even ein klein Hinterhof Projekt in dem zwei bis drei Frauen und ein Mann werden hochgezogen, kann Fleisch zu möblieren stärken den familiären diet. andererseits, , den 50 bis 150 Frauen ein Unternehmen meinen können, das bereitstellt, Teilzeit Anstellung und vielleicht extra Einkommen.

* Rabbits sind leicht, zu Hause zu heben-- ob Heimat ist in der Stadt oder dem country: Rabbit, den Ställe machen, nehmen viel Raum nicht auf, und Kaninchen sind sauber, beruhigen und leicht, für zu sorgen.

* Rabbit Häute sind auch wertvoll; sie können gemacht werden in Hüte, pelzbesetzte Kragen, Hausschuhe, Kissen, kleine Teppiche, und so weiter

Zusätzlich zu diesen Gründen, Gärtnern und Bauern oft benutzen Sie Kaninchen-Dünger als ein Dünger. Der Dünger von wellfed Kaninchen enthalten Stickstoff und Phosphor. Dieser Dünger kann direkt in die Erde gemischt werden, um dem Wuchs von zu helfen Bauern crops. Other Dünger, wie Hähnchen Dünger, kann diesen way. nicht benutzt werden, zu dem Dies besonders wichtig ist, Bauern und Gärtner, die nicht ander leisten können oder finden können, Dünger-- und zu jenen, die wünschen, das Beste zu machen, mögliche Verwendung von allen natürlichen Ressourcen ihrer Bauernhöfe.

Es gibt nur einige einfache Regeln, in Reihenfolge zu zu folgen ziehen Sie Kaninchen erfolgreich hoch:

- Build ein guter Stall.
- Begin mit gesunden Tieren.
- Give Kaninchen gute Sorge.

Warum versuchen Sie das Hochziehen von Kaninchen nicht? Glück und gute Landwirtschaft!

HARLAN H. D. ATTFIELD

<ZAHL; 2>

2 die vorbereiten, Kaninchen Hochzuziehen,

Die meisten Leute, die sich entscheiden, Kaninchen hochzuziehen, wollen produzieren meat. Und sie wollen dieses Fleisch als schnell produzieren, und billig, als possible. Therefore, vor dem Anfangen irgendeines Teiles, vom Projekt ist es sehr wichtig zu entscheiden:

* , den wieviel wohnen, es gibt für das Heben von rabbits. Wenn es gibt nur Zimmer für einige Ställe, es gibt ein begrenzen auf der Anzahl von Kaninchen, die hochgezogen werden können.

* , den was für Rassen von Kaninchen verfügbar sind. Einige Rassen von Kaninchen wachsen schneller; einige sind für eating. In anderen Wörtern besser, es ist notwendig, die Quellen von Kaninchen zu überprüfen, um zu sehen wenn eine gute Rasse ist, werden available. Und die Rasse bestimmen die Größe des Stalles.

* , den welche Essen für das Füttern der Kaninchen verfügbar sind. Rabbits wird eine Vielfalt von Essen essen, aber einige sind wichtiger für Kaninchen als others. Einiges werden Sie führen zu schnellerem Wuchs; einige sind teuerer; und so weiter

Es ist immer am besten, irgendein Projekt anzufangen durch das Studieren und das Verstehen aller Teile davon. Therefore, es ist ein Gutes Idee für einen künftigen Kaninchen-raiser, alle durchzulesen die Informationen in diesem Handbuch vor dem Machen irgendwelcher Schritte. Erfolgreiches Kaninchen Heben verläßt auf das Aufstellen das Anstrengung, damit wenige Probleme wahrscheinlich vorzukommen sind, und auf das Projekt leitend damit irgendwelche Probleme, auf denen kommen, kann schnell und leicht gehandhabt werden.

Das Wählen der Rasse von Kaninchen

Es gibt über sechzig Rassen und Vielfalten von Kaninchen ins world. Diese Rassen, oder andere Arten von Kaninchen, kann sein setzen Sie in drei Haupt Gruppen, Größe zufolge,:

Small Rassen Das polnische Kaninchen zum Beispiel wiegt ein wenig mehr als 1 kg als ein Erwachsener.

Mittel züchtet Das Neuseeland, Kalifornien und Palomino Rassen haben ein durchschnittliches erwachsenes Gewicht von 4 1/2 kg

Heavy Rassen, die Der Flämische Riese übermäßig wiegen kann, 6 1/2 kg als ein Erwachsener.

Dieses Handbuch konzentriert sich auf das Hochziehen von Kaninchen, um Fleisch zu produzieren für den Tisch, oder sogar für Gewinn. Für diesen Zweck, mittler-Rasse-Kaninchen, die schnell wachsen, sind die besten auserlesen-- sie werden mehr Fleisch von der Menge von nachgeben Essen fütterte sie.

<ZAHL; 3>

Der Stall

Der Stall, der in diesem Handbuch detailliert wird, (Teil B, " Stall-Konstruktion ") ist für mittler-Rasse-Kaninchen ideal. Es wurde entworfen und wurde erfolgreich vom Autor benutzt. Die folgende Diskussion präsentiert einige der bedeutenden Faktoren um daran zu denken, während das Bauen eines Stalles,; zum Beispiel, Schutz von Wind, Regen und Sonne.

Ställe können und machen Aussehen sehr anders als ein Gebiet zu das next. There sind keine kritische Maße, die das sagen, ein Stall muß gerade so hoch oder so lang sein, oder es wird nicht funktionieren. Es gibt Größe-Auswahlen, von denen für bestimmte Arten besser sind, rabbits. Und es gibt zum Beispiel Design differences.,

ein Stall in einem kalten Klima hat vielleicht Seiten ganz geschlossen; ein heißes feuchtes Klima schlägt vielleicht offenere Seiten vor und größer hängen Sie auf dem Dach über, um Belüftung zu vergrößern. Alle Ställe, egal wie sie ander oder ähnlich sind, sollten Sie stellen Sie bereit:

* viel von Luft

* Sonnenlicht zu das innerhalb thi-Käfige

* Schutz von Regen und Winden

* ein still nach Hause (ungestört durch Hunde)

* ein selbstreinigender Boden

* ein gutes Dach, das nicht leckt,

* ein Käfig für jedes mittler-Rasse-Kaninchen

* ein Wasser-Container für jedes Kaninchen

* ein manger(s) für Gras

Die meisten Leute ziehen vor, einen Stall für einen männlich zu bauen und zwei Frauen, aber einige zwei-Hase-Ställe (ein männlich und ein weiblich) wird auch gebaut.

Es kostet nur ein wenig mehr, um einen Stall für drei zu bauen Kaninchen als einen Stall für zwei zu bauen. , den Zwei Frauen werden, produzieren Sie jünger (und vergrößerte deshalb Fleisch-Ertrag), und der Mann wird nicht faul werden.

Jedes erwachsene Kaninchen muß seinen eigenen Käfig haben. , den Dies genau ist, important. Jedes Fach (Käfig) für eine mittler-Rasse Kaninchen sollte ungefähr 75cm messen (2 1/2 ft) breit, 1m (3 ft) tief, und 60cm (2 ft) hoch.

Materialien

Viele andere Arten von Materialien können benutzt werden, um zu bauen ein hutch., den sich Der Stall auf der nächsten Seite vorstellte, wurde gemacht das Benutzen:

* , der Fälle packt,

* vier Eukalyptus-Stangen

* 14 Streifen von Kiefer

* 1 cm (1/2 in) quadratisches Draht-Netzgewebe

* ein flaches Laken galvanisierten Eisens

* , der Draht bindet,

Ställe können von vielen anderen Wäldern und Materialien gemacht werden, das Einschließen von Bambus (sehen Sie Teil B).

<ZAHL; 4>

Schutz von Wetter

<ZAHL; 5>



Protect rabbits from rain by hanging plastic sheets or gunny sacks in front of hutch. Fold over top of hutch during good weather.

Die Wetter-Zustände, daß die meisten Affekt-Kaninchen Regen sind, es macht Sonne und heat. Rabbits Spaß oft, in der Sonne zu sitzen, aber sie müssen immer fähig sein, aus den direkten Strahlen von zu bekommen der sun. Zu viel Sonne kann Kaninchen töten. Kaninchen tolerieren kalt in ihrem " Pelz streicht ", verbessern Sie als äußerst Hitze.

Auch, schützen Sie Kaninchen vor Regen und Wind. Wenn die Seiten, Front oder Rücken des Stalles wird nur mit Draht gedeckt fangend, hängen Sie Laken von Plastik oder Sackleinen, plündert über diesen Räume während Regen, die Kaninchen zu schützen. Always setzen der eingeschlossene Rücken des Stalles zum Wind. Rabbits erleiden Sie wenn ungeschützt zu Einberufungen. In strengem Winter es ist am besten den Stall unter dem Schutz eines Daches zu bringen (eine Ecke der Scheune) oder unter den Dachüberhängen des Hauses.

Selbstreinigende Böden

<ZAHL; 6>

Der Boden des Stalles sollte nicht höher als die Taille sein und ist Selbst-cleaning. EIN selbstreinigender Boden wird durch gemacht 1 ausdehnend cm (1/2 in) quadratisches Draht-Netzgewebe in einem Rahmen. Schließen Sie an, Böden helfen, Kaninchen zu hindern, krank zu werden und sterbend weil Dünger und Urin-Paß durch die Löcher von der Draht und fällt zum Boden. Das innerhalb des Stalles dann Aufenthalte sauber, trocken und sanitär.

Der Dünger unter den Ställen sollte gesammelt werden jedes wenig Monate und gebraucht auf Gemüsegärten. Rabbit Dünger ist besser als der Dünger von Schweinen, Hähnchen oder Kühen für die Wachsen von Gemüsen.

<ZAHL; 7>

Vorbereitungen für das Füttern

Die Krippe

Kaninchen essen viel Gras und Blätter. , Aber Gras sollte nie würde auf dem Boden des Stalles verstreut. Gras auf der Boden des Stalles wird mit Dünger und Urin schmutzig, und dieses schmutzige Gras kann Kaninchen krank machen. , den Es leicht ist, um dieses Problem zu verhindern durch das Bauen einer einfacher Krippe, oder das Füttern von Stelle, von Draht-Netzgewebe oder Planken. , den Dies sein kann, befestigte zu das außerhalb des Stalles. Die Kaninchen dann ziehen Sie das Gras durch das Drahtgeflecht und füttern Sie sich als sie hunqry. sind, sollte Die Krippe groß genug sein um viel von Gras und Blättern zu halten.

<ZAHL; 8>

Manchmal kriechen Baby-Kaninchen aus dem Käfig ins manger. sie zu hindern, zum Boden zu fallen, Marke, eine Decke für die Krippe.

<ZAHL; 9>

Eine Krippe kann zwischen zwei Fächer in einen Stall gesetzt werden.

Es ist nicht notwendig, eine Krippe zu bauen, sondern es ist notwendig um das Essen verfügbar zu machen, damit es nicht auf liegt, das Stall-Boden, dirty. zu bekommen ein Weg, dieses zu machen sollte binden Gras und Blätter in Bündeln mit Schnur oder schließt an und hängt es auf das innerhalb des Stalles in der Nähe von der Front. Diese Methode werden Sie das Gras und die Blätter hindern, schmutzig zu werden oder verdarb.

Wasser

Kaninchen brauchen water., den Sie etwas Wasser vom Essen von Gras holen, und Blätter, aber sie brauchen mehr Wasser als dieses. Make sicher Kaninchen können Wasser bekommen, jedesmal wenn sie wünschen, zu trinken.

Um dieses zu machen, machen Sie einen automatischen Wasser-Container:

- Turn eine große Flasche übermäßig und befestigt es zu das innerhalb des Stalles damit die Lippe der Flasche ist in einem kleines Zinn can. Make sicher, es gibt keine scharfe Ränder auf der Blechdose.

- The Lippe der Flasche geht um lcm hinunter das bedecken Rand der Dose.
- Remove die Flasche und füllt die Dose und die Flasche mit Wasser.
- Replace die Flasche. Als das Kaninchen trinkt, bewässern Sie von der Dose, mehr Wasser wird von fallen das füllen ab und versorgen Kaninchen so mit Fülle von sauberes, frisches Wasser.

Füllen Sie die Flasche so oft wie notwendige, um zu bleiben das Wasser-Versorgung sauber und frisch-- wahrscheinlich wenigstens einmal pro Tag.

<ZAHL; 10>

Automatische bewässernde Systeme, die Leitung und Brustwarzen benutzen, sind ein gute Anlage für den Kaninchen-raiser, der viele hebt, Kaninchen.

Futter-Geschirre

Wenn möglich auserlesen ein schwerer Töpferwaren-irdene Topf mit über 8cm (3 in)-hohe sides. Heavy, die Geschirre nicht übermäßig gekippt werden können, durch die Kaninchen.

Ein Kaffee oder eine Butter-Blechdose würde benutzt. Nail die Dose zu ein kleiner board. Be sicher es gibt keine scharfe Ränder auf der Dose.

Ein Teil von Bambus mit einer Öffnung, der ein Loch in die Seite gerissen wird, kann seien Sie used. Fasten es zu einem kleinen Brett, darum von zu behalten das Rollen.

Welch Art von Container, die Sie benutzen, junge Kaninchen werden steigen Sie in them. Usually ein, Kaninchen werden nicht auf urinieren ihr Essen, aber konnte es mit ihrem droppings verunreinigen. Dieses werden Sie beobachtet zu werden haben.

Wenn füttert, Kugeln werden benutzt, ein Futter-Trichter kann wie gebaut werden der ein below., den Dies den Vorteil vom Bleiben immer hat, das Futter sauber.

<ZAHL; 11>

3 die sich für Kaninchen sorgen,

Wenn der Stall bereit ist, können die Kaninchen-raiser begonnen werden. Dieser Teil präsentiert Richtlinien für das Auswählen und handhabt und das Kümmern um Kaninchen.

Scheck Neuer Vorrat Vorsichtig

Die Quelle von Versorgung verläßt sich auf das Gebiet. In einigen Stellen-Kaninchen sind im Markt, von noch ein, verfügbar Kaninchen-Züchter oder vielleicht von staatlichen Quellen. Wo die Kaninchen von kommen, müssen sie überprüft werden

sehr vorsichtig, bevor sie nach Hause genommen werden. Remember das es ist gesunde Kaninchen zu Rasse und Gehaltserhöhung nicht möglich außer wenn die Kaninchen, mit denen Sie anfangen, gute Kaninchen sind.

Sie müssen fähig zu antworten sein JA zu allen sechs vom folgenden Fragen, bevor Sie die Kaninchen-Heimat nehmen,:

- Is das Tier aktiv und aufmerksam?
- Are seine Augen hell und klar?
- Is seine Nase reinigt, nicht runny?
- Are seine Ohren reinigen und trocknen innen?
- Is sein Pelz glättet und sauber?
- Are seine Füße trocknen und frei von sores?

Wenn das Kaninchen diesen Richtlinien paßt, erkundigen Sie sich nach dem Abfall von dem das Kaninchen came. Choose Kaninchen, die gekommen sind, von großen Abfällen und von Frauen, die gut gehabt haben, große litters. Do wählen keinen Bruder und Schwestern für aus züchtend; sie werden keine gesunde Jungtiere produzieren.

Die Handhaben von Kaninchen

Gerade ein kurzes Wort hier auf den richtigen Wegen zu handhaben rabbits. Rabbits sind generell zärtlich und werden nicht beißen, aber sie werden erschrocken und können sich verletzen oder der Hehler, wenn sie plötzlich springen. , zu dem Es immer besser ist, handhaben Sie Kaninchen richtig.

Heben Sie Kaninchen nie durch ihre Ohren oder Beine: , den sie sein können, verletzen Sie wenn diesen Weg gehoben.

Erwachsener rabbits es gibt von lockerer Haut beim Rücken von viel der Hals über den Schultern. Hold das Kaninchen durch dieses locker ziehen Sie mit einer Hand ab und unterstützen Sie sein Gewicht durch das Setzen Ihr andere Hand unter seinem Hinterteil (Schwanz). Be sicher zu halten das Kaninchens Füße weg von Ihnen, Kratzer von zu vermeiden das lange Zehe-Nägel.

Kleiner rabbits Lift und trägt kleine Kaninchen durch das Halten von ihnen zwischen den Hüften und den Rippen. , den Die Ferse der Hand sollte, stehen Sie dem Schwanz des Kaninchens gegenüber; der Kopf des Kaninchens sollte sein das Zeigen zum Boden.

<ZAHL; 12>

Schwerer rabbits Grasp eine Falte von Haut über der Schulter und dem lift. Griff das Kaninchen gegen Ihren Körper mit sein Kopf unter Ihrem arm. Ihr Unterarm sollen Sie sich an der Seite von ausstrecken das Tier, und Ihre Hand sollte sein unter dem Hinterteil des Kaninchens zu unterstützen das Gewicht des Kaninchens.

<ZAHL; 13>

Die Füttern von Kaninchen

Kaninchen sind nicht schwer zu füttern, weil sie weiterleben können, Pflanzen und andere Essen, die leicht zu finden sind. Rabbits bekommen Sie die Vitamine, Mineralien und Faser, die sie brauchen, indem sie essen, die Blätter von plants. Corn, Erdnüsse und andere Sämenkorner können würde von Kaninchen gegessen und ist eine gute Quelle von Protein.

Es ist wichtig, Kaninchen gut zu füttern. Well-chosen Essen können Sie, die Kaninchen zu behalten, befreit von Krankheit helfen, während Sie produzieren, guter Wuchs bei niedrigem cost. Breeding Frauen, rief, macht, Sie besonders wohlgenährt sein, gesunde Jungtiere zu produzieren Kaninchen und die Milch, sie zu füttern.

Elemente in Essen

protein. Protein ist eine Substanz, die Kaninchen hilft, wachsen Sie und Aufenthalt healthy. Protein wird in Kaninchen-Fleisch enthalten und ist ein Grund, warum Kaninchen-Fleisch so gesund ist. Rabbits muß würde Protein gefüttert, um Protein zu produzieren.

Proteine von Pflanzen sind für Kaninchen am besten. Rabbits kann essen Sie Erdnüsse (Erdnüsse), soyabeans, Sesam, Leinsamen, Hanfsame und cottonseed., die Diese Sämenkorner normalerweise geschliffen werden, und fügte zu Kaninchen-Breien und Kugeln hinzu. Whole soyabeans haben Sie ungefähr 36 prozentiges Protein, aber wird nicht durch genossen Kaninchen, außer wenn die Bohnen in eine Mahlzeit geschliffen werden, oder pelleted.

Öl-Kuchen von soyabean, Erdnuß, Sesam, Flachs und cottonseed ist eine gute Quelle von Protein.

salt. There ist ein erkennbarer Unterschied in der Menge von salzen Sie, jedes Kaninchen konsumiert täglich. aus diesem Grund ist es ein gute Idee, einen Block oder eine Spule von Salz in jeden Käfig zu setzen. Jedes Kaninchen wird das nehmen, was es braucht, indem es das Salz leckt.

Salz sollte Kontakt nicht mit Metall-Käfig-Teilen, solch, kommen als screening. Salt direkt zum Essen in hinzugefügt werden kann, ein Quantität von 1/2 Prozent.

vitamins. Sehr klein wird über die Anforderung eines Kaninchens gewußt für keine der Vitamine, aber Kaninchen brauchen Vitamine EIN und D. Freshly Schnitt grüne Pflanzen, irgendeine Wurzel kupiert und hoch Qualität Heu sind ausgezeichnete Quellen von Vitamin A. Das Beste Quelle von Vitamin, die D in geheilten Ballaststoffe besonders gefunden wird, Feld-geheilt luzerne. Fresh Schnitt-Grünflächen werden auch bereitstellen Vitamin B und Vitamin E. When arbeiten und Kosten-Genehmigung, Kaninchen sollten guter Qualität grüne Pflanzen als Teil gegeben werden von ihrer Nahrung.

minerals., den Total trockene und frische grüne Pflanzen einige enthalten werden, oder all die Mineralien brauchten durch Kaninchen. Wenn das Kaninchen Futter wird richtig balanciert, es wird von Mineralien viel geben für das Kaninchen.

Essen

Getreide, das grains. Rabbits Hafer, Weizen, essen wird, Gerste und masern Sie Sorghum (milo, kafir, feterito, hegari, darso und sagrain) . These, den Körner vielleicht ganz gefüttert werden, sobald das junge Kaninchen kommen bei drei Wochen aus der Nest-Kiste von age. Grains fütterte zu Kaninchen, sollte mollig und verdorben sein oder moldy. Soft Vielfalten von Mais (Mais) kann durch gegessen werden Kaninchen, aber die zäheren, steinerneren Arten müssen zerdrückt werden oder ground. Rabbits genießen Sonnenblumenkerne, aber diese Sämenkorner wird mehr normalerweise für andere Zwecke geschätzt.

Wenn Kaninchen erlaubt wird, von mehreren Arten von zu wählen, masern Sie, ihre ersten auserlesen werden Hafer sein, die durch weich gefolgt werden, Vielfalten von Weizen, Korn-Sorghum und Gerste.

Normalerweise ist es eine gute Idee, um eine Futter-Mischung vorzubereiten der enthält eine Anzahl von Körnern. Here ist ein Vorschlag für ein Korn-Mischung (die Quantitäten sind für eine kleine Zahl von Kaninchen):

1kg ganze Hafer

1kg Weizen

1/2kg zerdrückt Mais (weiche Vielfalten)

1kg soyabean-Mahlzeit in Kugel-Form

Pflege macht, sollte voll-gefüttert werden (Essen ununterbrochen verfügbar) das Korn mix. Dry macht und treibt, Böcke sollten sein gegeben, so viel wie sie in 20-30 Minuten konsumieren werden.

Körner, die geschliffen werden und in einen Brei gemacht werden, sollten sein entmutigte mit Wasser vor dem Dienen. Otherwise, Staub-Wille, kommen Sie in die Nase des Kaninchens und den Ursache-Ärger hinein. Wenn möglich, sollten Futter pelleted sein: es gibt weniger überflüssig wenn Kugeln benutzt werden.

Grün füttert, und roots. Rabbits genießen grüne Pflanzen; zart Spazierstock-Spitzen sind auch mit Erfolg benutzt worden. Rabbits auch Sie Süßkartoffeln, Möhren, Zucker-Rüben, Rüben, und weiße Kartoffeln.

Grüne Pflanzen und Wurzel-Ernten enthalten Protein, Mineralien, und Vitamine; sie sind fast 90 prozentiges Wasser. Diese Inhalte machen Sie sie zu sehr wichtigem Essen für Kaninchen.

Aber, wenn Kaninchen zu viele Grün dann essen, werden sie essen Sie genug nicht von, konzentrierte, füttert (wie Korn-Mischungen). Und diese konzentrierten Essen produzieren schnelleren Gewicht-Gewinn.

ERLAUBEN SIE GRÜNEM FUTTER NIE, IN HAUFEN ZU STEHEN UND WIRD GEHEIZT VOR dem Füttern ZU RABBITS. Grünes Futter, das gewesen ist, das zu lang Stehen kann ernste Verdauungs Probleme in verursachen der herd. Also, setzen Sie GRÜN NIE $AUF DEM BODEN VON DAS KÄFIG, wo sie schmutzig werden werden. Disease wird gestrichen wenn Grünflächen werden nicht aufgehängt oder werden in eine Krippe gesetzt.

getrocknete Pflanzen (Heu) . Luzerne; Klee, Erdnuß, lespedeza, vetch und kudzu-Heu sind für Kaninchen ausgezeichnet. Hay muß seien Sie von gutem quality:, den es aufgehalten grün, klein sein sollte, grün in Farbe, free von Staub und formt, mit einem netten Geruch. Zartes Elefant-Gras und Sudan Gras können zu Kaninchen gefüttert werden aber enthält weniger Protein, als die Pflanzen zuerst aufzählten. Überstehen Sie oft, Zustände berücksichtigen das Machen nicht oder von hay. lagernd Wenn Heu verfügbar ist, kann es gesetzt werden vor den Kaninchen jederzeit. , über den Sie essen werden, 55-85 gm (2-3 oz), täglich.

kommerzieller feeds. Many Kaninchen-raisers ziehen vor, zu kaufen ein VOLLSTÄNDIGES Futter für ihre Kaninchen. , den Die Pakete sollten, zeigen Sie die Menge von Protein, dick, und so weiter, daß sie contain. Die folgenden Tabelle-Shows wieviel von jedem von das aufgezählt, erfordern Substanzen-Kaninchen. Wenn das Konzentrat enthält diese Bestandteile in über den gleichen Prozentsatz Mengen, es ist ein vollständiges Futter.

Suggested Kaninchen-Futter konzentriert Analyse

Protein 15-20%

dicker 3-5.5%

Faser 14-20%

Stickstoff-freier 44-50% nehmen heraus

Asche oder mineral 4.5-6.5%

coccidiostats., den Diese vorbeugende Medizinen für coccidiosis sind, (Sehen Sie Teil 6) . If verfügbar, es ist weise hinzuzufügen irgendeine Medizin zum Futter, Kaninchen vor diesem zu schützen disease. EINE Ration, die 0.025 Prozent von sulfaquinoxaline enthält, ist für das Reduzieren der Verseuchung von wirksam Darm und Leber-Arten von coccidiosis in der Herde. Die Verwendung von Medikament sollte die Stelle nicht von gut nehmen management., den Es ökonomischer zu verhindern ist, als zu heilen.

Junge Kaninchen werden von dieser Krankheit frei ertragen, aber dürfen schnell wird durch das Lecken ihrer schmutzigen Füße, Pelz, infiziert oder Stall-Ausrüstung, oder durch das Essen von Futter oder das Trinken von Wasser der wird mit den " Eiern " verunreinigt (oocysts) von der Krankheit Organismus (protozoans).

Wenn Kaninchen in Gebieten hochgezogen werden, geben es beträchtlich Luftfeuchtigkeit oder lange Perioden von Regen oder Nebel, die coccidia-Verseuchung, bauen Sie es vielleicht auf, verursacht schwere Verluste. Dünger-Kugeln verursachen keine Gefahr, während sie ganz sind, aber sobald sie anfangen, zusammenzubrechen oder die Krankheit zerstampft werden, Organismus sind released. Ställe mit selbstreinigenden Böden, Krippen und richtiges Essen, und gutes Management übt alle helfen Sie, die Möglichkeiten von Infektion zu reduzieren. Authorities auf Kaninchen Heben fühlt, daß es unmöglich loszuwerden ist, die Krankheit ganz, aber sie fühlen diese guten Übungen wie jene, die hier erwähnt werden, kann das Problem beachtlich reduzieren.

andere foods. Küche verschrottet, außer fettig und verdorben Essen, wird von Kaninchen genossen. Durch Gewicht, trocken oder alt Brot hat über den gleichen Fütterung-Wert als die Getreide-Körner. Brot kann helfen, den Preis vom Füttern von

Kaninchen zu reduzieren. Das Früchte und Rinden von Orangen und qrapefruits und Garnierungen von Gemüsen kann zu Kaninchen gefüttert werden. Cow oder Ziege Milch ist für rabbits. gut Obwohl Geflügel-Brei (formulierte für Züchter und Schichten) ist generell teuerer als Kaninchen-Futter, es ist für ernährungsmäßig adäquat Familiensitz-Kaninchen.

Eine Notiz auf Futter-Lagerung

Behalten Sie Futter trocken und schützen Sie es gegen Insekten und Nagetiere. Halten Sie Futter von Hunden und Katzen fern; sie können eine Quelle von sein Bandwurm-Verseuchung.

Richtige Mengen und Kombinationen von Essen

Kaninchen kann eine Kombination von Essen gegeben werden so lang wie das totale Essen-Aufnahme geht um das Gleiche. im allgemeinen, Herde Böcke (Männer) und trocken macht (Frauen, die nicht züchten,) Bedürfnis nur 1/2 Tasse Brei jeder Tag; schwangere oder pflegerische Frauen erfordern Sie 3/4-1 Tasse pro Tag.

bucks. Rabbits kann voll-gefüttert werden, indem man Essen in verläßt, das Stall bei allen times. Rabbits fütterte durch diese Methode, essen Sie klein Mengen von Essen öfter und Gewinn-Gewicht schneller. Herde bockt aber, sollte Hand sein, die gefüttert wird. , den Dies bedeutet, das Liefern von ihnen nur mit so viel Essen wie ihnen kann in essen 20-30 minutes., Wenn Herde-Böcken erlaubt wird, zu essen, alle Zeit, sie werden dick und faul. Zwei möglich täglich die Füttern von Plänen denn Böcke sind:

125-185gm (4 1/2-6 1/2 oz) Konzentrat (das Verlassen auf Gewicht), plus 15-Augenblickes , der von Grün füttert.

Oder

85gm (3oz) von Korn-Mischung und alle gutes Qualität Heu oder Grünfläche, die sie essen werden.

Please note: Alle Gewicht-Umwandlungen, hier und Folgen, wird in ungefähren Zahlen gegeben.

Does

EINE Damhirschkuh um sechs Monate von Alter werden bei der Rate von essen 3.8 Prozent ihres lebenden Gewichtes täglich. zum Beispiel, ein 4.5kg (ungefähr 10 Pfund) Damhirschkuh wird .038 x 4.5 essen = .17kg = 170gm (oder .038 x 10 = .38 Pfund = ungefähr 6oz), täglich. Wenn Heu und Körner werden gefüttert, sie wird 70gm konsumieren (2 1/2 oz) von einem Korn Mischung und ungefähr 100gm (3 1/2 oz) von Heu, 170gm zu machen (6oz).

Die folgende Tabelle ist ein guter Führer, wenn sie eine Kombination füttert, von Konzentrat und Grün:

Konzentrieren-Grünfläche Fütterung Tabelle

Weight von Doe Daily Ration 45gm (1.6oz) oder mehr Grün, PLUS Konzentrat-Ration von:

2 1/4 kg (ungefähr 5 lb) 70-85gm (2 1/2-3oz)

4 1/2 kg (ungefähr 10 lb) 125-140gm (4 1/2-5oz)

6 3/4 kg (ungefähr 15 lb) 185-200gm (6 1/2-7oz)

Note: den Die Mengen von Konzentraten reduziert werden können, durch das Vergrößern von den Mengen von Grün, die gefüttert werden.

Um eine Damhirschkuh korrekt zu füttern die Kaninchen-raiser müssen wissen wenn sie ist pregnant., den Ein erfahren Kaninchen-raiser sich fühlen können, für die Babys in der Mutter bei 14 Tagen nach dem Paaren (sehen Sie Teil 4 und züchtet " Kaninchen "). , den EINE Damhirschkuh gegeben werden muß, alle Konzentrate, die sie ohne Verschwendung essen wird, während pregnant. Nach den jungen Kaninchen werden ertragen, setzen Sie zu fort füttern Sie der Damhirschkuh und den jungen Kaninchen alle Konzentrate sie werden ohne Verschwendung essen. , den die Nahrung Der Damhirschkuh sein sollte, reduzierte nur, wenn die jungen Kaninchen entfernt werden, und bis Schwangerschaft wird wieder bemerkt.

Einen 1.8kg produzierend (4 Pfund) Brathühnchen Generell nimmt es 7kg (15.4 Pfund) von vollständigem Konzentrat (Kugeln sind am besten) zu produzieren Sie einen 1.8kg (4 Pfund) Brathühnchen in 8 Wochen. Das folgende Tabelle zeigt vier andere Fütterung-Pläne. , den Dies sollte, helfen Sie dem Kaninchen-raiser entscheiden, welcher Plan für seines am besten ist, Situation.

Concentrates Luzerne Hay Grün Futter Time

Planen Sie A 7kg (15.4 lb)---- ---- 8 Wochen

Planen Sie B 4kg (8.8 lb) 1.5kg (3.2 Pfund) ---- 8 Wochen

Planen Sie C 4.5-5kg (10-11 lb)---- .5-lkg (1-2 Pfund) 8 Wochen

Planen Sie D 3.6-4kg (8-9 lb)---- 1.4-1.8kg (3-4 Pfund) 10-11 Wochen

Note: Amount von Essen, 1.8kg zu produzieren (4 Pfund) Brathühnchen schließt auch einen Teil ein, der für Damhirschkuh von erfordert wird, , der durch das Entwöhnen züchtet.

4 Zucht-Kaninchen

Wenn das Kaufen von Kaninchen herausfindet, wie alt sie sind. Das Minimum-Alter für Zucht verläßt sich auf Art: schwere Arten dauern Sie 9-12 Monate, bevor sie alt genug, um zu züchten sind,; Neuseeland Weiße sind bereit, bei 6-9 Monaten von zu züchten Alter.

Züchten Sie keine Frauen, bis sie alt genug, um zu handhaben sind, die Belastung von nursing. ein Mann, oder bockt, machen Sie Dienst als ein viele als zehn Frauen, aber er sollte nicht benutzt werden mehr als zwei oder drei Male ein week. EINE maximale Verwendung für Kurzschluß Perioden wären fünf Zeiten-Wochenschrift.

Wie Kaninchen zu paaren sind

Die Frau, oder Damhirschkuh, wird wahrscheinlich widersetzen, zu haben das Bock setzte in ihren Käfig und könnte befallen oder verletzt ihn. Setzen Sie die Damhirschkuh deshalb immer in den Käfig des Bockes für mating. Do stören die Tiere und die Marke nicht sichre Leute und Hunde sind nicht, around. People und Hunde können erschrecken das Kaninchen und sie werden sich nicht paaren.

<ZAHL; 14>

Wenn die Damhirschkuh in den Käfig des Bockes gesetzt wird, wird er wahrscheinlich besteigen Sie ihren quickly. Wenn nach einigen Sekunden der Bock Stürze über auf seiner Seite oder fällt plötzlich rückwärts und paart hat place. Often genommen wenn die Bock-Stürze, die er sehen wird, als ob sein ganzer Körper plötzlich festgezogen hat. Allow nur ein oder two falls. Then entfernen die Damhirschkuh und setzen ihr zurück in ihrem own-Käfig.

LASSEN SIE DIE DAMHIRSCHKUH NICHT ALLEN TAG MIT DEM BOCK LANG BLEIBEN. Wenn Paarung ist nicht innerhalb der ersten wenigen Minuten vorgekommen, entfernen Sie die Damhirschkuh und den Versuch wieder nach einigen Stunden.

Sobald die Damhirschkuh gepaart worden ist und zu ihrem Käfig zurückgekommen worden ist, Schreiben Sie DAS DATUM VON dem Paaren auf einer kleinen Karte auf, das befestigt wird, hoch ins innerhalb des Stalles. , Wenn Sie nicht schreiben, das Datum entlang werden Sie nicht wissen, wann für die Jungtiere zu fühlen ist, innerhalb der Damhirschkuh bei 14 Tagen oder setzte eine Nest-Kiste in ihren Käfig bevor sie Geburt gibt.

Das Halten der Damhirschkuh für das Paaren

Manchmal wird eine Damhirschkuh in der Ecke vom Bock verstecken sperren Sie in einen Käfig, und werd er nicht fähig sein, sie zu besteigen. Wenn dieses passiert, helfen Sie dem Bock durch das Halten der Damhirschkuh für das Paaren. Dies ist sehr leicht zu machen.

<ZAHL; 15>

Benutzen Sie eine von beiden Hand, um die Ohren und eine Falte von Haut übermäßig zu halten der shoulders. Place der Damhirschkuh Ihre andere Hand unter ihrem Körper und zwischen ihrer Hirschkuh legs. Place ein Ihrer Finger auf jede Seite des Schwanzes und schiebt sachte rückwärts. Dieses Handlung wird den Schwanz der Damhirschkuh werfen. auf über ihrem Rücken, damit der Bock kann schnell besteigen und kann sie paaren. Wenn die Damhirschkuh Schwanz ist hinunter, der Bock wird nicht fähig sein, sie zu paaren.

Das Fühlen für Junge Kaninchen

Es ist möglich, die kleinen, runden Babys innen zu fühlen das Damhirschkuh zwei Wochen nach Zucht haben stattgefunden. Keep die Damhirschkuh in ihrem cage. Hold ihre Ohren und eine Falte von Haut über das Schultern, als ob das Halten der Damhirschkuh für das Paaren. Slide die andere Hand unter ihrem Magen mit Ihrem Daumen auf einem Seite vom Magen und Ihren Fingern auf das ander. Gently drücken Sie in auf der Magen-Mauer mit Ihrem Daumen und Ihren Fingern und schiebt Ihre Hand rückwärts und vorwärts. , Wenn die Damhirschkuh ist, schwanger, werden Sie fähig sein, klein, hart zu fühlen, marbleshaped, Klumpen, als Sie Ihre Finger hin und her mit schieben, der Magen drückte sachte zwischen ihnen. , den Diese " Prüfung " ist, ein gutes, aber muß oft geübt werden, um erfolgreich zu sein.

Das Anzünden

Das Anzünden ist die Tat vom Geben von Geburt. , den Die Damhirschkuh anzünden wird, 31-32 Tage nach mating. EINE Damhirschkuh wird weniger wahrscheinlich essen Essen zwei oder drei Tage vor dem Anzünden. Fünf bis sieben Tage vor dem anzündenden Datum, setz eine kleine Kiste, rief ein Nest-Kiste, im Käfig der Damhirschkuh. , in dem Sie Geburt geben wird, dieser box. Es ist normalerweise möglich, Kisten zu finden der arbeiten Sie sehr gut, aber wenn Sie eine Kiste bauen müssen, sollen es sein leicht und mißt ungefähr 30cm tiefe x 35cm breite x 20-30cm hoch (12 " x 14 " x 8-12 ").

Stelle nichts in der Nest-Kiste oder dem Stall wenn das Wetter ist warm., den Die Damhirschkuh Pelz von ihrem Magen ziehen wird, um zu machen, die Kiste comfortable., Wenn das Wetter kalt ist, Stelle trocken Gras oder Stroh im Stall drei Tage vor dem Anzünden, und die Damhirschkuh wird sie eigenes Nest vorbereiten.

Zünden Sie normalerweise bei Nacht an. Als jedes Baby wird ertragen, das Damhirschkuh wird es lecken und wird ihm Milch geben. Does geben normalerweise Geburt zu 4 oder 6 Babys das erste Mal. Nach, daß eine Damhirschkuh normalerweise produziert 6-8 Babys bei jedem Anzünden.

Ein oder zwei Tage nach den Kaninchen werden ertragen, sehen Sie vorsichtig in der Kiste für irgendwelche toten Babys. Move der Pelz zu einem unterstützen Sie einen kleinen Stock oder einen Bleistift. Remove keine der Sie Fund.

Wenn die Damhirschkuh mit ihren Babys ist, ist es zu Unterhalt wichtig Kinder und Hunde vom Stören von ihr. , Wenn die Damhirschkuh wird, erschrocken, könnte sie ihre Jungtiere verletzen, indem sie in springt, das boxen Sie schnell und das Zerdrücken von ihnen. Oder, erschrak, essen Sie ihr babies. Does wird auch ihre Jungtiere essen, wenn sie machen, haben Sie genug Protein-Essen nicht. , Wenn eine Damhirschkuh fortsetzt, zu machen, dieses nach einer Sekunde oder drittem Mal aber sie sollte sein ersetzte.

Das Folgen sind einige Beispiele von Nest-Kisten, die Sie machen können.

<ZAHL; 16>

<ZAHL; 17>

Diese schließen-Deckel Winter Nest Kiste wird die Körper-Wärme halten vom Baby rabbits., den Diese Nest-Kisten von 1cm gemacht werden können, (1/2 ") oder sogar 2 1/2cm (1 ") Bauholz. ein 4 x 8 ' (über 1.2 x 2.4m) Laken von Sperrholz wird vier dieser Kisten machen, mit gerade ein wenig übrig. Use Holz für diese Kisten. Wenn Metall benutzt wird, wird die Kiste " schwitzen und wird eine Gesundheit schaffen Problem für die jungen Kaninchen.

Die Damhirschkuh wird die Spitze der Kiste benutzen, um auf zu sitzen. , den Dies erlaubt, ihr weg von ihren Babys und ihren Unterhalt zu bekommen ihre Füße wärmen. Wenn die Jungtiere einiges Wochen alt sind, werden sie anfangen, zu folgen die Damhirschkuh bis zum top. Do verläßt die Nest-Kiste nicht in der Käfig auch long., den Die Kaninchen das Holz schnell beschmutzen werden, Oberflächen und Probleme mit coccidiosis (sehen Sie Seite 40) konnten resultieren.

Eine Nest-Kiste kann von einem Nagel-Fäßchen gemacht werden, das seine Seite angeschaltet wird, und glich mit einem Stück Holz aus, das über der Front genagelt wird.

<ZAHL; 18>

Das Entwöhnen

Die Entwöhnen von Mitteln, die die Babys von ihrer Mutter entfernen. Junge Kaninchen öffnen ihre Augen 10-11 Tage nach Geburt. Sie werden aus der Nest-Kiste wegen drei Wochen kommen von Alter, und zu dieser Zeit fangen sie an, Essen ander zu essen als milk. ihrer Mutter Sie sollten von getrennt werden ihr Mutter bei eiqht-Wochen (kein bald) und setzte in noch ein Käfig für fattening., Wenn die Jungtiere vorher getrennt werden, sie sind acht Wochen alt, sie werden aufhören, für zuzunehmen einige Tage, und könnte sogar abnehmen.

Nach dem Entwöhnen, züchten Sie die Damhirschkuh wieder. Wean und züchtet das Damhirschkuh auf dem gleichen day., Wenn die Damhirschkuh jedes schwanger wird, Zeit wird sie gezüchtet, sie kann vier Abfälle in 12 produzieren months., Aber erwartet nicht, dieses Ziel zuerst zu erreichen; es ist manchmal sogar für erfahrenes Kaninchen schwierig raisers

Besonders stark macht, kann aber bei 7 Wochen gezüchtet werden oder sogar 6 Wochen nach dem Anzünden. , Wenn dies gemacht wird, die Jungtiere sollen Sie fortsetzen, bei ihrer Mutter für zu bleiben das voll 8 Wochen vor weaning. Wenn das macht, wird richtig gefüttert damit sie können die Belastung ertragen, dies ist ein sehr gutes System von breeding., den Die Damhirschkuh in ihrem Käfig für nur einen Kurzschluß allein ist, Zeit vor dem nächsten Abfall wird angezündet, und der Stall Ausrüstung wird zum besten Vorteil benutzt.

Das Bestimmen von Geschlecht

Dies kann beim Entwöhnen von Zeit gemacht werden (8 Wochen) oder früher, nachdem Sie experience. Hold das junge Kaninchen als gewonnen haben, gezeigt hier oder setzt es auf seinen Rücken auf einen Tisch. There sind zwei Öffnungen in der Nähe vom tail. Die Öffnung nächst der Schwanz ist wo der droppings (Dünger) kommen Sie hinaus. Above, den dies ist, die Außen Öffnung der Geschlecht-Orgeln. Place Ihr Daumen unter dieser Öffnung und Ihrem Finger über ihm. Press entlang gently., Als der Sie das rote, feuchte Fleisch inside. sehen werden, Sie drücken Sie entlang, wird einen Schlitz oder einen Kreis mit sehen ein kleines Loch im middle., Wenn Sie einen Schlitz, das Kaninchen, sehen, ist ein female., Wenn Sie einen Kreis sehen, ist das Kaninchen ein Mann.

<ZAHL; 19>

Waise-Abfälle

Manchmal stirbt eine Damhirschkuh beim Anzünden oder in Kürze danach. Viele Kaninchen-Züchter werden keine Zeit dauern, um Waise hochzuziehen junge, aber junge Kaninchen, die ohne eine Damhirschkuh verlassen werden, können gefüttert werden ganze Kuh oder Ziege-Milch von einer Flasche bis fähig zu essen Körner und Gras bei zwei Wochen von Alter. , Als das Hochziehen von Waise, Abfälle-Sorge muß genommen werden, um alle Fütterung-Ausrüstung zu behalten sanitär.

Ausgleichende Abfall-Größe

Einige Züchter paaren sich mehrere, macht früh, damit sie werden, alle zünden innerhalb eines Tages oder zwei von einander an. Wenn eine Damhirschkuh hat einen außergewöhnlich großen Abfall (10-16) und noch eine Damhirschkuh hat einen kleinen Abfall (2-4), einige der Kaninchen von das großer Abfall kann dem kleineren übergeben werden. EIN Abfall von Acht ist eine ideale Größe.

Griff junge Kaninchen so klein wie mögliche, aber macht nicht sorgen Sie sich um das Zerstören des Duftes der menschlichen Hand. Als bald, als die Kaninchen in die Nest-Kiste irgendein Geruch gesetzt werden, das Hängen an ihnen wird schnell zerstört.

Mißerfolge, die ausdachten

Die Damhirschkuh kann unfruchtbar sein, nicht fähig, Jungtiere zu produzieren, wenn das Essen-Ration wird verwirrt, oder das Wetter ist zu heiß oder auch cold. Commercial Zucht hat gekürzt das unfruchtbar Tendenz, damit es möglich ist, vier zu erreichen, oder mehr Abfälle in einem year. However, eine ausgeglichene Nahrung ist genau wichtig wenn macht, und Böcke sollten diese hohe Rate erkennen von Produktion.

Böcke und macht das, ist zu alt, kann für Vorstellung erachten misses. Mit ausgezeichneter Sorge und das Füttern eines Kaninchen-Willens bleiben Sie zu Rasse 3-4 Jahre gewinnbringend. Nach dieser Zeit tendieren Sie, kleine Abfälle von 2 oder 3 Jungtieren zu gebären.

Tiere, die gekannt worden sind, um gut für mehrere zu produzieren, Jahre sind von besonderem Interesse für den Kaninchen-raiser. Keep Aufzeichnungen von gut macht und auserlesene Kaninchen von den Abfällen von dieses hervorragend macht, um beiseite für Ersatz zu bleiben Vorrat.

Wunde Sprunggelenke oder andere Verletzungen können einen Verlust von Energie verursachen in beiden macht, und bucks. Rabbits muß ausgezeichnet bekommen Sorge kombinierte mit gutem Management, um gewinnbringend zu erreichen Ergebnisse.

5 bleibende Aufzeichnungen

Wenn Sie nur Kaninchen in Ihrem Hinterhof, Sie, hochziehen, Sie keine umfangreiche Aufzeichnungen wahrscheinlich behalten. Das folgende Formen sollten genügend beweisen. However einmal Sie kommen in ein Kaninchen hinein, das Unternehmen hebt, wo das Bleiben ein Produktion-Zeitplan wird äußerst wichtig, mehr ausführliche Aufzeichnungen sind vielleicht notwendig.

Basic Aufzeichnungen

<ZAHL; 20>

Dieses Beispiel nimmt auf (auf der Seite vor, und unter) enthalten Sie Informationen wesentlich zum vorsichtigen Kaninchen-raiser. Gute Aufzeichnungen außer timen Sie und erlauben Sie Planung jährlicher Produktion. Aufzeichnungen sind der Schlüssel zu erfolgreicher Zucht und das Handhaben vom litter. Make eine individuelle Aufzeichnung für jedes Zucht-Tier und heftet es irgendwo im Käfig an wo es trocken bleiben wird und nicht auf durch gekaut werden wird, das Kaninchen.

<ZAHL; 21>

Vollständiges Aufzeichnung Bleiben

Frau Anne Faunce, ein kommerzieller Kaninchen-raiser ins Vereinigt Staaten fügten Landschaft und Kleine Vorrat-Zeitschrift ein, (*) Januar 1974, diese guten Aufzeichnungen führen zu zugenommenem Vergnügen,

(*) Jetzt gewußt einfach als Landschaft, veröffentlichte Monatszeitschrift bei 312 Portland Straße, Autobahn 19 Osten, Waterloo, Wisconsin, 53594 USA

Zufriedenstellung, und netto Einkommen in einem Kaninchen, das Bedienung hebt. Der Rest dieses Teiles wird frei von ihr gezeichnet Artikel:

Gut-organisiert, nimmt einfache Aufzeichnung, die Systeme behält, lang zu nicht bleiben Sie aktuell und sollte täglich behalten werden. , den Die Zeit gutgenützt ist. Gute Aufzeichnungen helfen, Sterblichkeit zu reduzieren (Tod-Rate) und zuzunehmen reguläre Zucht und Vorstellung-Raten. , den Sie dem Kaninchen-raiser helfen, um Abfälle in Zahl und Größe vom young. Alle uniform zu behalten von diese Faktoren können zu zugenommenen Gewinnen führen.

Unser Aufzeichnung-System entwickelte sich, als wir das lernten, was wir wollten und brauchten, um zu wissen, und wie es einfach aufzunehmen ist. , für den Jedes Stückchen wesentlich ist, richtige Einschätzung von macht und bockt. Die Bock-Aufführung-Aufzeichnungen hat unsere netto Gewinne ständig vergrößert.

Der Punkt vom Behalten von Aufzeichnungen sollte sie benutzen, deshalb bleiben wir bleibend individuelle Aufführung nimmt in unserem Haus auf und auf jeder Stall-Tür.

Wir waren fähig, solche Sachen zu prüfen als das Kontrolle-füttern und das Züchten Zeitplane mit der Hilfe von unserem individuellen Bock und unserer Damhirschkuh nehmen auf, plus die Herde-Aufführung-Aufzeichnungen. Here sind einige von den Sachen, die wir fanden,:

* For unsere Herde, Kontrolle-Fütterung produzierte das Gleiche oder bessere Gewichte in der gleichen Tag-Lebensdauer als das Frei-füttern, ein niedriger Sterblichkeitsziffer, sowie der reduzierte Futter-Preis.

* EIN 38-39 Tag-rebreed-Zeitplan war der praktischste und gewinnbringend im Liefern unseres Prozessors mit einem Minimum Brathühnchen Gewicht von 4.5 Pfund (2kg) . We bekommen 5 1/4 Abfälle pro Jahr. , den Wir auch 5-6 Jahr alt werden, macht das gewinnbringend Produzieren wirft Abfall weg.

* Our, zu dem Herde uns mehr Geld eigentlich machte, wenn wir Abfall begrenzten, sortieren nach der Größe zu 7 oder 8 Jungtieren und hängen von der Damhirschkuh ab.

Wir benutzen die gleichen Briefköpfe für Damhirschkuh, und Bock-Aufführung nimmt auf und der does'-Stall krempelt; dies vereinfacht Aufnahme und das Verstehen. Wir haben gefunden, daß alles, was wir über die Böcke wissen müssen, während das Arbeiten, im rabbitry ist das Datum, das gezüchtet wird, und die Zahl der Damhirschkuh.

Wir machen Eintritte in jeder Säule auf dem does'-Stall cards. Wenn mit Nest-Kiste-Abfällen arbeitend, die Informationen sind bei Hand zu richtig entscheiden Sie wie viele jung, um mit ihr zu gehen, oder wie erfolgreich ein Pflege ziehen Sie auf, sie ist.

Wir entwarfen, daß unser eigener Stall krempelt ,-- unserem eigenen needs. zufolge Auf die folgenden Seiten sind Beispiel-Karten und Erklärungen von wie wir stellen Sie sie auf:

PLEASE NOTE: In den " Gewicht "-Säulen auf das Stall krempelt, Zahlen werden in Pfund gegeben. ein Kilogramm = 2.2 Pfund.

Macht

<ZAHL; 22>

Säule, die 1: Bock--Identifikation des Bockes in irgendeiner Paarung benutzte, ist mußte Abfälle aus anderen Kumpeln vergleichen, oder andere Abfälle aus dem gleichen mates. können Sie sich auf künftige Paarungen und Vorrat einstellen Auswahl.

Säule 2: Datum-bred, die Dieses Datum Ihnen zeigt, als die Damhirschkuh sollte, zünden Sie an, und, wann in die Nest-Kiste zu setzen ist. Ein " L " (spät) in diesem Säule würde zeigen, daß die Damhirschkuh keinen rebreed auf Zeitplan machte. It 's sehr wichtig, dieses zu wissen: , wenn sie immer ein später Züchter, Auswahl, ist, ihr (trennen Sie sie hinaus) . We lernte, zu bewahren, versehen Sie nur aus, macht welcher züchtete und dachte regelmäßig aus, Jahr um (zusätzlich zu ander wünschenswerte Merkmale) . This schließt Böcke auch ein.

Das Benutzen der Informationen in dieser Säule zahlt sich in zugenommener Vorstellung aus Raten-- und gesamte Produktion: in 1965 unsere jährliche Vorstellung-Rate war 82 Prozent, und unser Sturz (August durch Dezember) Zuchten Vorstellung-Rate war 70 Prozent. Durch 1971 jährliche Vorstellung-Rate war 95 Prozent und die Herbst-Rate waren 93 Prozent. Das macht gezüchtet auf setzen Sie an, und dachte aus.

Säule 3: Datum-kindled, für die Dies Ihnen einen Hinweis-Punkt gibt, das Aufnehmen später von genauem Alter in Tagen der Jungtiere. Shows wenn das Damhirschkuh ist immer spät, früh oder pünktlich. brauchte nicht auf Bock-Aufzeichnungen.

Säule 4: Anzahl von Jungtieren

angezündete Shows die totale Anzahl von Jungtieren, die ertragen wird. , Wenn einige ertragen würden, tot, oder starb bald nach Geburt, wir zeigten dieses als ein zwei Teil figure: 14/10-- 14 die totale Zahl, die ertragen wird, und 10 die Zahl lebend und well., den Diese Säule in Damhirschkuh und Bock-Einschätzung nützlich ist.

Anzahl von Jungtieren bei 1 week Wir fanden häufig, es nimmt 4-7 Tage alle Abfälle hinunter zur genauen Zahl entscheiden, die wir erwarten, zu lassen die Damhirschkuh zu heben;, damit wir uns entschieden, daß diese eine Woche ein praktisches Datum war. Diese Zahl wird als der Hinweis für das Überprüfen später irgendeiner Sterblichkeit benutzt on., Wenn es ein Gutes, schlechtes eben oder uneben ist, (in Qualität-- numerieren Sie nicht) werfen Sie Abfall weg, der geeignete Brief wird hinzugefügt.

Säule 5: Jungtiere bei 3 weeks EINE Zusammenfassung von der Nest-Kiste des Abfalles history. Useful in früher Schätzung von Zahl für künftige Verkäufe, und in Einschätzung von Vatertier und Damm.

Zahl-Shows-Überleben und Sterblichkeit. Den Abfall einzuschätzen, fügen Sie hinzu das geeigneter Brief.

altern Sie in Tage-Genauigkeit in Tagen, ist für richtige Bewertung von notwendig die Rate von Gewicht-Gewinn in der Nest-Kiste.

Gewicht von Abfall-Shows die Pflege-Fähigkeit der Damhirschkuh, und auch das Vatertier Fähigkeit, seinen Jungtieren die Fähigkeit zu, den meisten von der Damhirschkuh zu machen geben milk., den Sie mit anderen Abfällen auf dem Vatertier und Damm vergleichen können, records. Wenn sie für Herde-Böcke züchtet, ist die melkende Fähigkeit der Damhirschkuh von großer Wichtigkeit, weil sie dieses auf durch ihren Sohn zu herüberreicht, seine Töchter.

Säule 6: Weaned This und die nächste Säule wirklich Summe es auf für den kommerziellen Kaninchen-raiser.

Zahl-Shows-Überleben und Sterblichkeit im Abfall. , den Dies ist, wichtig für Verkäufe, und als Teil von der Aufführung der Damhirschkuh und Bockes Aufzeichnungen.

altern Sie in Tagen, weil ein ganzer Abfall in der Nähe von einem Pfund pro Tag bei gewinnen kann, das Alter von 8-9 Wochen, Genauigkeit ist für sachliche Beurteilung wesentlich.

Gewicht von Abfall, bei dem Wir den ganzen Abfall wiegen, sobald-- es ist viel schneller und leichter, und genauer als ein durch einen und das Hinzufügen davon up., Weil wir die totale Anzahl von Pfund, die produziert wird, eng anschauen, es ist logisch.

Säule 7: Zahl Marktfähig auf Time (MOT) This ist das wirklicher Schlüssel zu profitieren und Verlust auf einem Abfall, und spiegelt die Aufführung wider --und Rentabilität-- von einer Damhirschkuh oder einem Bock. Included in dieser Zahl sind irgendwelche Jungtiere, die für das Züchten von Vorrat gespart werden,: , obwohl sie sein sollten, hinaus getrennt, wären sie natürlich marktfähig. Holdover Brathühnchen als Züchter benutzt zu werden ißt auf dem Gewinn von jenes verkauft, und nimmt aufwärts wertvoller Stall-Raum-- damit benutzt Ihre Aufzeichnungen gut und bringt Sorge herein das Auswählen von Zucht-Vorrat.

Säule 8: bemerkt Limited, den Raum das Begrenzen von Notizen zu wichtig bedeutet, Sachen, und das Abkürzen leserlich, wie WNB für " nasse Nest-Kiste," O.F. für " von Futter, " S4D für " bewahrte 4, macht " (für Rasse-Vorrat), und so weiter

Böcke

<ZAHL; 23>

Nachdem wir angefangen hatten, die gleichen Aufzeichnungen auf der Aufführung der Böcke zu behalten, Laken, wir fanden, daß es einen hilfreichen Unterschied im Beurteilen machte, das performance. von Damhirschkuh, den Wir jetzt sicher sein könnten, wenn einige Sachen wären, das die Schuld von Damhirschkuh oder not. EIN hoher Sterblichkeit-Satz unter Brathühnchen oder ein unregelmäßige Wachstumsrate wäre Grund, um die Aufzeichnungen von zu überprüfen das Böcke, mit denen sie gepaart worden ist. , Wenn sich jene Böcke gesund zeigen, dann sie kann gepflückt werden, ohne Zeit, Futter und Stall-Raum auf zu verschwenden noch " eine Chance ";, wenn sich die Böcke nicht gesund zeigen, dann die Damhirschkuh, Dienst hat fortgesetzt, und wir überprüfen die Böcke. Having sowohl Damhirschkuh als auch Bock-Aufzeichnungen machen es viel leichter, die armen Künstler zu finden schneller und, ohne keines mehr Geld zu verlieren. , nachdem die Aufzeichnungen gehabt haben, gewesen im Gebrauch für ein Jahr oder so, diese Probleme sind wahrscheinlich zu verschwinden.

Das Behalten des Bockes nimmt auf, und das Benutzen von ihnen hat unsere Herde wirklich gemacht mehr profitable., den Wir fähig waren, an Tatsachen statt Eindrücke zu arbeiten. Sobald ich unseren Lieblings Bock auf die " Eintopfgericht-Liste setzen mußte. " In Boshaftigkeit des Bockes wird schön gebaut, ein großartiger Arbeiter mit sogar das widerwillig macht und wirft gut, uniformieren Sie, leicht identifizierbar Abfälle, sein Sprößling wuchs gerade gut nicht heraus. Sein MOT equalled nur 46 percent! Other Sachen, von denen were: niedrige Zahl

heraufführten, Jungtiere zündeten an, hohe anzündende Sterblichkeit, hohe Brathühnchen-Sterblichkeit, uneben, litters. Total gute pflückende Gründe, die nicht leicht hinaus draußen gefunden werden, Aufzeichnungen. Ungefähr drei Male pro Jahr wir schätzen die Aufführung-Aufzeichnung jedes Bockes ein und gibt ihm eine Herde rating., den Dies zusätzlich zu normaler Prüfung ist, und irgendein besonderes Zuschauen brauchte zwischen. Young Böcke sind zuerst schätzte ein, nachdem ihr zehnter Zucht-Abfall gegangen ist, um zu verkaufen. Foster Abfälle, oder irgendein Abfall wo mehr als zwei hinzugefügt worden sind, ist nicht included. Durch das Dauern bei einer Woche der totalen Anzahlen von Jungtieren, bei entwöhnend und MOT, den wir die Prozent Raten für Sterblichkeit kalkulieren können, und Marktfähigkeit-auf-Rhythmus.

Die Herde bockt dann, wird Prozentsatz, der gehoben wird, zufolge aufgezählt und MOT vom litters. Jene beim Boden sind culled. Das erste Mal wir benutzten diese Klasse, 7 aus 28 Böcke wurden für gepflückt weniger als ein 65 prozentige MOT rating. Exactly ein Jahr später, 6 aus 28 mit weniger als eine 80 prozentige MOT Klasse gepflückt wurde. Vier Monate später, wir, pflückte zwei Böcke; alle Ruhe hatte 85-95 prozentige MOT. Und zusammen mit die Zunahme in MOT kam eine sehr nette Zunahme in profits! Wenn etwas unerwünscht zeigte sich in einem Bock zwischen Herde-Klassen, wir machten warten Sie nicht, ihn zu pflücken.

Ich kann genug nicht betonen, wieviel Unterschied es finanziell machen kann, zu bleiben und Aufführung-Aufzeichnungen auf beiden zu benutzen macht und bucks. Sie geben Sie die Informationen notwendig, um gute Management-Entscheidungen auf zu treffen züchtend, Auswahl und das Pflücken.

6 Kaninchen-Krankheiten und Ihre Kontrolle

Es ist am besten, Krankheit zu verhindern; das Behandeln von Krankheit ist oft difficult. Following, zu dem diese einfachen Regeln viel machen können, bleibende Kaninchen befreien von Krankheit:

* Keep Stall, Nest-Kisten, Wasser-Dosen und Krippen CLEAN. Clean Draht-Böden mit Seife und Wasser nach jedem Abfall.

* Give Kaninchen frisches grünes Essen zu essen. Remove altes Essen von Krippen.

* Protect Kaninchen von intensiver Sonne, Regen und Einberufungen.

* Keep unfreundliche Hunde weg.

* Use Draht-Netzgewebe für Stall-Böden. Stall Böden sollten " cornerless " sein.

* Take kranke Kaninchen weg von den anderen Kaninchen sofort.

* Watch für Zeichen der folgenden Krankheiten.

Coccidiosis (intestinal)

Signs: Diarrhea, ein geschwollener belly. Rabbit sitzt in ein krümmte Position und will eat. Often nicht das Kaninchen wankt herum und ist nicht fähig zu bleiben sein balance., zwischen dem Diese Krankheit Kaninchen befällt, die Alter von 2 und 10 weeks. Coccidiosis kann Tod verursachen.

Cause: EIN ein-celled tierischer Parasit, der im Haus wohnt, das , der von den Gedärme des Kaninchens füttert.

Treatment: Mecryl Pulver, Sulphamezathine, Amprol, Sulfaquinoxaline, oder Eimryl Urgence werden zu benutzt verhindern und behandeln diesen disease. Follow das Richtungen für jedes Medikament vorsichtig.

Coccidiosis (setzte fort)

Von dem Diese Krankheit durch den droppings gestrichen wird, infizierte rabbits. Keep der Stall sauber überhaupt times: eine beschmutzen Ecke im Stall, könnte führen zu dieser Krankheit.

Stall Böden sollten von Draht netting. sein Wenn the, den Netzgewebe dicht ausgedehnt wird, es wird geben klein brauchen Sie für zusätzlichen supports. Wenn Sie muß benutzen, Holz-Unterstützungen bauen sie wie gezeigt here., den Sie auch Stab-Eisen benutzen können.

<ZAHL; 24>

Ohr-Räude

Signs: Dirty ears. Krusten auf innerer Oberfläche von Ohr. Often, den das Kaninchen seinen Kopf oder Kratzer schüttelt, seine Ohren.

Cause: Mites. Diese Insekten sind so klein der Sie können Sie sehen sie nur mit einem vergrößernden glass. Sie graben unter der Haut auf das innerhalb das Die Ohren von Kaninchen und der Ursache-Schmerz.

Treatment: Remove die Krusten mit Ihrem fingernail. Go zu einer Pharmazie und bittet um eine Lösung von 0.25 prozentiger Lindane in pflanzlichem Öl, oder eine Mischung von 2 teilt iodoform, 10 Teile-Äther und 25 teilt pflanzlichen oil. Swab entweder ein von diesen Lösungen im Ohr mit einem Stück Stoff oder cotton. Apply wieder nach einem week. Check die Ohren aller anderen Kaninchen für dieses Problem.

Remarks:, den Diese Krankheit die Zentren von Gleichgewicht zerstören kann, in inneren ear. des Kaninchens, Wenn ein Kaninchen nicht ist, behandelte für diese Krankheit, es wird in resultieren ein konditionieren gewußt als ironischer neck:, den das Kaninchen wird, hold sein Kopf zu einer Seite oder fällt over. Once , den dies einem Kaninchen passiert, es kann nicht behandelt werden. Die beste Sache zu machen sollte es verhindern, indem er behandelt, die Ohr-Räude prompt.

Kälten

Signs: Sneezing und das Reiben der Nase mit der Front feet. Flüssigkeit wird den nose. Dieses herumzeigen Flüssigkeit ist vielleicht dünn und räumt vielleicht auf, oder es ist vielleicht dick und gelb.

Cause: Several Arten von Bakterias und Virus.

Treatment: Reduce die Menge von Konzentraten, die Sie sind, , der Ihr Kaninchen für einigen days. Give gibt, das Kaninchen alles grüne Gras und die Blätter, die es will.

Remarks:, den Diese Krankheit Tiere in über-überfüllt befällt, klammer, schmutziger hutches. Protect Kaninchen von regnen. Always stellen viel frische Grün zu bereit essen.

Wunde Sprunggelenke

Signs: Rocking vorwärts auf Front-Füßen; Hirschkuh-Füße zeigen sores auf dem bottom. Rabbit verlieren vielleicht den Pelz polstern auf der Sohle des Fußes aus, mit Maßstäben und irritation in diesem Gebiet. Wenn erlaubt hat, um zu bekommen schlechter, der Fuß blutet oder wird mit schwammig Eiter Entwässern davon.

Cause: Wet oder rauhe Böden, die Kaninchen schlagen, ihr Füße upon. Böden, die scharf sind, das sackt ab zu sehr, oder dieses ist schmutzig, trägt vielleicht bei dazu.

Treatment: Soak die affektierten Teile in warmem, seifigem Wasser bis die Krusten kommen off. Rinse und trocknen thoroughly. Rub in Salbe, aber benutzt nicht damit much, daß der Fuß klebrig wird und aufwärts auswählt, Erde (benutzen Sie Zink-Salbe, Petroleum-Gelee, sulfathiazole Salbe).

Remarks: Keep Kaninchen ungestört, damit sie nicht schlagen, ihr feet. Select Ersatz-Vorrat von beruhigen Tiere.

Wunde Augen

Signs: Rubbing Augen mit feet. Fluid von Auge entweder dünn und räumt auf, oder dick und gelb.

Cause: Irritation von Fliegen oder Verletzung von zackig schließen an, und so weiter

Treatment: Clean Augen mit Bor Säure-Wasser, oder gerade sauber water. Apply Augen Salbe (Antibiotikum, versilbern Oxid, gelbes Oxid von Quecksilber, Argyrol).

Remarks: Den Dies oft contagious. Isolate krank sein kann, Tiere.

Ziehen Sie Räude ab

Signs:, den Das Kaninchen einem intensiven Jucken, die Haut, zeigt, wird rot gefärbt und wird geärgert, die Haare kommen aus, und gelbe Krusten sind vielleicht anwesend.

Cause: Mites (ähnlich zu Ohr-Räude).

Treatment: Wash das affektierte Gebiet mit warmem seifigem Wasser, spülen und trocknen (important:-Kaninchen können bekommen Lungenentzündung wenn nicht schnell getrocknet hat) . Clip das Haare weg von den Rändern des wunden

Gebietes. Rub trockene Blumen von Schwefel in die Haut thoroughly. Wiederholung Behandlung in vier bis sechs Tage.

Remarks: Contagious. Isolate entzündeter animals. Clean und desinfiziert Ställe, durch die benutzt worden sind, kranke Tiere.

Mucoid Enteritis (scheuert oder schwillt an)

Signs: Drinking, aber keine eating. Rabbits sitzen gekrümmt auf mit dem Schielen von Augen, schleifen Sie ihre Zähne, haben stumpfe, rauhe Mäntel, und geschwollene Bäuche. , den Sie vielleicht Durchfall haben.

Cause:, den Die Ursache nicht gekannt wird, aber es wird nicht gedacht to ist ansteckend.

Treatment: Keine bestimmte Behandlung known. Take weg alle Essen und bewässert 48 Stunden; geben Sie dann klein Quantitäten grünen Essens einige Tage. Let , den sie kleine Mengen von Wasser während dieses haben, TIME.

Remarks: Usually beeinflußt Kaninchen gegen sechs Wochen von altern. Do verwirren dieses nicht mit coccidiosis, , der behandelt werden kann.

Lungenentzündung

Signs: Heavy, den breathing. Kaninchen seinen Kopf oft neigt, zurück, damit die Nase im air. Rabbit ist, bewegt sich sehr klein und will keinen eat. Körper Temperatur, wie von einem Thermometer gezeigt, das gesetzt wird, im Mastdarm, ist hoch (39.5-41 [Grade] C-- oder 103 -106 [Grade] F) . As, den das Tier die Augen schlechter wird, und Ohren zeigen vielleicht eine bläuliche Farbe wegen fehlen von Sauerstoff.

Cause: Bacteria. Usually kommt mit anderen Krankheiten, oder wenn Tier schwanger ist und Jungtiere nährt, oder kühlte, und wet. Also befällt sehr jung Kaninchen.

Treatment: Injections von Antibiotikas gegeben vorher das Krankheit verfolgt far. auch Der Tierarzt weiter wird 200,000 Einheiten normalerweise plus 0.25gm geben dihydroatreptomycin Intra-muskulös (in ein Muskel) in der Hirschkuh leg. Keep Tier warm und trocken, reduzieren Sie Konzentrate und geben Sie viel von grünes Futter und und sauberes Wasser.

Remarks: Die kritische Zeit für die Damhirschkuh sind zwei Wochen vor und zwei Wochen nachdem kindling. Watch die Damhirschkuh eng während dieses times. Pneumonia kann auch direkt nach vielen von folgen das ander diseases. Watch dafür. Treat und sondert ab infizierte Tiere prompt.

Überzog Brust (überzog Euter)

Signs: In frühen Fällen, die Brüste (ein oder mehr) ist Firma, Rosa und Gefühl heiß zum touch. Later auf, kleine Knoten können in den Brüsten gespürt werden. Following dieses, die Brüste verdunkeln vielleicht und become trocknen und sprangen.

Cause: Milk, die nicht von den Brüsten genommen werden, fasten enough. Damhirschkuh hat vielleicht zu wenige Jungtiere, oder ist nicht , die sie lassen, nähren.

Treatment: Reduce Konzentrate und stellt viel von Grün bereit füttern und sauberer water. Rub Lanolin (oder Öl oder irgendeine Art vom Haut-machen Weich von Agenten) gut in die Brüste und versucht, Milch dazuzubringen, durch zu fließen , der massiert und Jungtiere zu nurse. ermutigt, Wenn Brüste springen, machen weich Krusten und erlauben, um zu entwässern, , aber öffnet nicht mit einem Messer.

Remarks: Do entwöhnen alle jungen Kaninchen schwer von nicht Melken macht zur gleichen Zeit; nehmen Sie einigen

überzog Brust (setzte fort)

zu einer Zeit von her. Breed schwerer milkers ein wenige Tage vor dem Entwöhnen des young. Wenn ein schwer milker verliert einen Abfall, züchten Sie sie wieder bei once. Zucht hilft, die Milch in zu reduzieren die Brüste.

Avoid Störungen, insbesondere bei Nacht.

Wenn Brüste anfangen, blau zu werden, sollte die Damhirschkuh haben antibiotische Einspritzungen (Penizillin) bei once. Isolate die Damhirschkuh und wäscht Ihre Hände macht gründlich vor dem Nehmen von Sorge von ander. 7 Tötung, beim Abziehen, und das Bräunen von Kaninchen

Tiere werden getötet, wenn sie den gewünschten Markt erreichen, weight. In vielen Fällen, das Bekommen des Fleisches ist wichtiger als das Sorgen um die Haut. Wenn möglich, Kaninchen sind blieb länger und nahm bei einer langsameren Rate zu, damit sie kann bis den kombinierten Wert des Fleisches behalten werden (Kadaver) und Fell (Haut) wird die höchste Rückkehr bringen.

In den Vereinigten Staaten verkauften 80 Prozent der Kaninchen wird als " Brathühnchen " eingestuft. , den Dies bedeutet, daß sie zart sind, und geeignet für schnellere kochende Methoden. , der eingestuft werden sollte, als Brathühnchen, Mittel und schwere Rassen von Kaninchen ist entwöhnte und verkaufte bei zwei Monaten Alter, wenn ihr Gewicht Durchschnitte 1.7-2 kg (3 3/4-4 1/2 Pfund). Das Fleisch der Sie eigentlich ist fähig, " aus dem Tier zu kleiden-- oder Brathühnchen Ertrag des Kadavers-- wird den Durchschnitt von 50 bis 60 Prozent ermitteln vom lebenden Gewicht.

Zur Zeit von Schlachten sollte es irgendein Fett hinüber geben das Rippen, am Rückgrat, in den Flanken, und um das tailhead und die Nieren, beim Vergrößern des Bekleidung-Prozentes, über dem des dünnen Kaninchens. , dieses zu machen, Kaninchen müssen sein richtig fed. Small Knochen und dünne Haut-Show-Qualität in ein animal. wegen dieses, mittlere Rassen mit kleinen Knochen und dünne Haut wird höheres Bekleidung-Prozent geben als eine mit großen Knochen und dicken Häuten.

Die Menge von Essen im Magen und Gedärme haben ein Wirkung auf dem Kleiden von percent., Wenn das Kaninchen draußen ist, Essen und bewässert einige Stunden vor dem Töten, die Bekleidung, Prozente werden niedriger sein.

Der Gewinn, den Sie von einem Brathühnchen bekommen, wird von wieviel abhängen füttern Sie und wirtschaftlicher Preis, den Sie vom Brathühnchen abziehen müssen, Markt-Preis.

Ins folgend zwei Teile sind schrittweise Anweisungen auf dem Töten und dem Abziehen, und das Bräunen der Häute von Kaninchen.

<ZAHL; 25>

Das Töten und das Abziehen eines Kaninchens

Kaninchen sind leichter zu töten und zu reinigen als irgendein anderer Bauernhof animals. Mit Erfahrung, die ganze Arbeit kann in gemacht werden zwei oder drei minutes! Follow diese Schritte:

Töten Sie das Kaninchen schnell und schmerzlos. Halten Sie es durch die Hinterbein, Kopf, der down. In einigem zeigt, Sekunden wird er aufhören, sich abzumühen und hängen Sie quietly. Mit dem Rand von das Handfläche Ihrer freien Hand (oder mit ein Leitung oder Stock), geben Sie ein schnell " " Schlag zum Rücken von hackend sein neck. Dieser Schlag wird töten das Kaninchen schnell ohne Schmerz.

<ZAHL; 26>

Einige Leute ziehen das Ausrenken vor der Hals, einen rabbit. zu töten Das Bedienung ist schneller als das blasen Sie zum Hals und paßte gut zum kommerziellen Kaninchen-raiser. Halten Sie das Kaninchen durch die Hinterbein mit einem hand. Der Daumen von das andere Hand wird auf den Hals gesetzt gerade hinter den Ohren, mit das Finger, die den Hals begreifen. Hinunter auf dem Daumen drückend während das Ziehen des Kaninchens schnell empor renkt den Hals aus.

<ZAHL; 27>

Danach, hängen Sie das Kaninchen durch ein vom Hinterbein Benutzen ein Stück Seil oder dreht zusammen, oder durch das Setzen eines großen Nagels durch den Hinterbein.

<ZAHL; 28>

Danach, schneiden Sie vom Kopf, Front-Füße, und der ein Hirschkuh-Fuß befestigte nicht durch Seil oder Nagel.

<ZAHL; 29>

Jetzt, schneiden Sie die Haut auf das innerhalb das Bein des Fußes, das vom Seil befestigt wird, oder nail. Continue, den dies zum Schwanz schnitt, und auf dem anderen Bein.

<ZAHL; 30>

<ZAHL; 31>

Schälen Sie die Haut von beiden Hinterbein und schnitt dem Schwanz off. Start das Herunterziehen der Haut.

<ZAHL; 32>

Setzen Sie das Herunterziehen der Haut fort und ganz vom Körper.

<ZAHL; 33>

<ZAHL; 34>

Jetzt, mit Ihrem Messer, schlitzen Sie auf das Körper des Kaninchens auf der Mitte vom Bauch, aber schneidet nicht die Gedärme.

Um zu beenden, entfernen Sie alles in außer den Nieren, Leber und Herz, das gut zu essen ist. Zerschneiden Sie den Kadaver oder den Koch ganz.

Das Bräunen einer Kaninchen-Haut

In der Einführung zu diesem Handbuch wurde es gesagt, daß viel schöne Gegenstände könnten mit Kaninchen-Häuten gemacht werden. Rabbit Häute müssen gegerbt werden (behandelte, damit sie weich sein werden, und dauerhaft), bevor sie benutzt werden können, um Hüte zu machen, Teppiche, und anderer articles. Dies ist nicht sehr schwierig zu machen und ein Methode wird hinunter gegeben:

* Take die Haut und schlitzte es auf dem middle. Tack auf es auf einem Brett oder der Seite des Hauses mit das Pelz Seite entlang und die Haut ergreift aufwärts.

* The folgender Tag untersucht die Haut, um zu sehen wenn es trocknet rundweg. Remove irgendwelche Flecke von Fett oder Fleisch. Let die Haut trocknet ganz.

* After, den die Haut trocken ist, durchnässen Sie es in sauberem, kühlem Wasser. Change das Wasser mehrerer times., Wenn die Haut ist, weich, liegen Sie es über einer Stange oder einem Brett und arbeiten Sie hinüber die Haut-Seite mit einer groben Akte oder stumpfem Messer zu entfernen irgendein Gewebe, Fleisch oder fat., die Dies auch wird, entfernen irgendein Fett oder oil. Alles Fett und das Öl muß aus der Haut vor dem Fortsetzen sein.

* Now setzte die Haut in warmes Wasser mit 30gm (über 1oz) von Limo oder Borax zum gallon. Get Limo oder Borax beim pharmacy. Add eine kleine Seife zu helfen entfernen das Fett und reinigen den skin. Wash das ziehen in dieser Mischung ab und entfernen dann die Haut. Squeeze das Wasser aus der Haut langsam und vorsichtig.

* Wash die Haut in einem kleinen Benzin, das wird, entfernen die letzten Stückchen von Erde und Fett.

* Now, den die Haut bereit ist, mit Chemikalien bewahrt zu werden, (bräunte sich). Sie werden über .45kg brauchen (1 Pfund) von Ammoniak-Alaun (Ammonium-Aluminium-sulfate) oder Pottasche Alaun (Kalium-Aluminium-sulfate) zu lösen in einer Gallone water. Danach auf, fügen ungefähr 110gm hinzu (4oz) das Waschen von Limo und über 225gm (8oz) von Salz in 1/2 Gallone Wasser. Pour die Limo-Salz-Wasser-Mischung langsam ins Alaun-Wasser Mischung, während das Rühren gut.

* Take über eine Tasse dieser Mischung und fügt das Backen hinzu bemehlen, bis Sie einen dünnen paste. Tack ausmachen, die Haut glatt mit der Pelz-Seite down. Put the Paste auf der Haut-Seite ungefähr 1/2cm (1/4 in) dick. Lay ein Stück Papier oder Stoff über ihm.

* The nächstes Tag-Kratzen von der meisten der Paste und setzte einige mehr auf again. Repeat dieses für zwei mehr Tage (Wiederholung für einziges mehr Tag wenn das Haut ist von einem jungen Kaninchen).

Now zog noch eine Schicht von Paste an und verläßt es vier Tage.

Finally, kratzen Sie von der Paste und waschen Sie die Haut in eine Gallone Wasser mit ungefähr 30gm (1oz) von Limo oder Borax. Rinse die Haut in kühlem Wasser. Squeeze aus allem Wasser und dehnt die Haut in allen aus directions. Pull die Haut-Seite hin und her über dem Rand von einem board. Viel des Erfolges im Machen einer weicher Haut verläßt sich auf dieses, das wiederholt wird, funktionieren. After Sie haben die Haut für gearbeitet ein lange Zeit es wird weich werden und dry., den Es ist, bereiten jetzt, um in schöne Teppiche gemacht zu werden, Hüte, Handtaschen oder Kragen für Kleider.

<ZAHL; 35>



Rabbit skins can be stretched over wire, flesh side out, and kept dry for several months before tanning.

Part 2

<ZAHL; 36>

Stall-Konstruktion

Detaillierte Anweisungen schrittweise für das Bauen eines Holzes Stall mit einem Laken-Metall-Dach wird zuerst präsentiert. Das Folgen sind einige Skizzen und Aufzeichnungen auf einer Variation auf dieses Grund Stall-Design, das mit einem Holz-Rahmen und einem Bambus gemacht wird, Seiten und roof. Beide Ställe stellen guten Lebensunterhalt bereit und das Züchten von Raum für Kaninchen.

<ZAHL; 37>

Holz-Stall mit Metall-Dach

<ZAHL; 38>

VITA Volunteer George R. Clark hat diese Konstruktion vorbereitet Schritte von Plänen, die von Harlan Attfield bereitgestellt werden. Irgendein Konstruktion tips: Be sicher alle Ränder auf Boden sind spülen Sie, deshalb fallen alle Kaninchen-droppings zum Boden.

Wo schließt an, Netzgewebe wird zu Pfählen, Drehung-Draht-Ränder, befestigt Verletzung zu den Kaninchen zu vermeiden entlang.

<ZAHL; 39>

<ZAHL; 40>

<ZAHL; 41>

<ZAHL; 42>

<ZAHL; 43>

<ZAHL; 44>

<ZAHL; 45> <ZAHL; 46>

<ZAHL; 47>

<ZAHL; 48>

<ZAHL; 49>

<ZAHL; 50>

<ZAHL; 51>

<ZAHL; 52>

<ZAHL; 53> <ZAHL; 54>

<ZAHL; 55>

<ZAHL; 56>

<ZAHL; 57>

<ZAHL; 58>

<ZAHL; 59>

Holz und Bambus-Stall



<ZAHL; 60>

Setzen Sie ein Teakholz frame. Attach ein Drahtgeflecht zusammen Boden (1 x 1cm / 1/2 x 1/2 " Quadrate).

<ZAHL; 61>

* Nail lebensgroße Streifen von Bambus am Rücken umgeben mit einer Mauer.

* Nail doppelte Mauern von Bambus-Streifen, jedes zu bilden Trennwand zwischen Käfigen, und einzelne Mauern von Bambus zieht an jedem Ende des Stalles aus.

* In diesem Stall, Nest-Kisten machten von Holz-Kisten sind in die Außen Mauer von richtig gebaut worden jedes der Ende-Käfige. <ZAHL; 62>



* ein Dach zu machen, Riß-Bambus-Längen in Seiten, Chip aus den " Netzknoten " mit einem Hammer, malen Sie die Innen Oberflächen mit einer imprägnierenden Substanz wie Kreosot oder solignum, und nagelt hinunter auf die Spitze des Stall-

Rahmens in einem ineinandergreifenden Muster (gezeigt oben) . Make das Bambus Längen sehnen sich genug, um die Front zu überschneiden und hinter vom Stall.

* Nach dem Nageln die unterst Bambus-Stücke entlang von das bedachen, Sie können jedes Spitze-Stück entweder zum Boden nageln eine, oder lag alle. die Spitze-Stücke in Stelle ohne Nageln, und hält sie permanent durch das Nageln fest jeder Hälfte Meter oder damit durch zwei oder drei Hälfte-Teile von Bambus legte an der Länge des Stalles hinüber das bedecken Stücke.

<ZAHL; 63>

Rahmen Sie eine Tür, um die ganze Front jedes Käfigs zu decken, und deckt mit Bambus-Streifen, die in jeden Rahmen genagelt werden. Befestigen Sie die Türen am Stall mit zwei 4 ", hängt jedes ab und eine Klinke für jedes.

Wurm-Landwirtschaft

Verwandeln Sie Ihre Kaninchen-Dünger-Ansammlung in eine Heimat für einen von den größten Freunden des Bauern-- der Regenwurm.

Das Anbauen von Würmern ist leicht, und die Vorteile sind viele. Rabbit düngen Sie und überflüssiges Futter, das durch die Draht-Marke gut fällt, Essen für Regenwürmer.

Ausgrabung-Gruben oder Stelle seichte Kästen unter den Stall-Böden, und versehen Sie sie mit worms., Die Würmer werden konsumieren und werden kompostieren die Kugeln, das Schaffen von Boden-Dünger fein von das genau höchste Qualität.

Kästen oder seichte Gruben können von Zement, Zinder, gebildet werden Block, oder Bauholz (2 x 12 ") und wird einige Zoll in untergegangen der ground., weil Würmer am besten bei Temperaturen oben züchten, 4.5 [Grade] C (40 [Grade]), Gruben sollten untergegangen werden, muhen Sie genug, um zu versichern gegen Erde-Temperaturen kälter als dieses während des Herbstes. Während Winters werden sich die Würmer verlangsamen oder werden schlafend werden. Die Kolonie wird schnell während des Frühlings wieder-aktivieren wenn die Erde-Temperatur-Anstiege.

Kästen oder Gruben sollten einige Zentimeter oder Zoll größer sein als die eigentliche Größe des Stalles, damit sie fangen werden, jedes Kugel.

Grube-laufen Sie " ", Würmer sind ökonomisch, mit zu beginnen und sind erhältlich von Regenwurm-Züchtern und vielen Kaninchen-raisers. Einen " Wurm-Bauernhof " zu beginnen legte eine Starter-Mischung von 50 Prozent hin Kaninchen-Dünger und 50 prozentiges Torf-Moos oder feiner Kompost. Wenn Maulwürfe sind ein Problem, lcm (1/2 ") quadratisches Drahtgeflecht kann sein haben Sie früher den Boden und die Seiten der Grube gefüttert. einige Zoll von zerdrücktem Kalkstein kann beim Boden der Grube gesetzt werden Dünger-Säure zu korrigieren und eine poröse Basis für bereitzustellen Ableitung.

Behalten Sie die Gruben durch das Streuen mit einem kleinen Wasser feucht. Irgendein Kaninchen und Wurm-Züchter machen eine Gewohnheit vom Leeren das bewässern Sie irdenen Töpfe direkt in die Wurm-Kästen, wenn Sie auffrischen, das

Wasser der Kaninchen supply., den Die einzige andere Arbeit mit sich brachte, ist levelling die Gruben als der Kompost ", wächst " und das Abzweigen über den Kasten-Inhalten jede 2 oder 3 Wochen, es locker zu behalten.

Wenn die Kästen von Würmern zu voll werden, sollten einige von ihnen sein blechte (eine Schaufel wird die Würmer schneiden), und zahlte in ein der Garten, Blume-Betten, oder Gewächshaus, oder sie können verkauft werden.

Ein ausgezeichnetes Buch auf Regenwürmern, die von Kaninchen benutzt wird, Züchter in den Vereinigten Staaten sind:

Raising Regenwürmer für Gewinn

durch Graf-B.-Schilder P. O. Box 472 Elgin, Illinois 60120, U S EIN

Cost: $2.00 (U.S.)

© 1977 ECHO Inc.