Gardening Con Il Seasons

ISBN 0-86619-124-0

[C] VITA. Inc. 1979

VITA 1600 Boulevard di Wilson, Seguito 500 Arlington, Virginia i 22209 Stati Uniti
TEL: 703/276-1800. Facsimile: 703/243-1865 Internet di : pr-info@vita.org
(mailto:pr-info@vita.org)

INDICE DI

1 che decide cosa per crescere

2 che imparano a seminare

3 guida un passo alla volta facendo del giardinaggio

4 direzioni che piantano per ciascuno vegetale

INTRODUZIONE DI

Facendo del giardinaggio con le Stagioni č stato adattato da un libretto preparato come parte di un approccio innovativo e significativo a sviluppo di comunitŕ quello č in preparazione in Bangladesh. Il Sylhet Pacco Programma č procurato di Servizi Volontari ed Internazionali, Inc. (IVS), un rispettato Stati Uniti-basato organizzazione di sviluppo privata, nella cooperazione con tre agenzie locali--il Sviluppo rurale che Addestra Istituto, il Bangladesh Rural Comitato di avanzamento e lo Sviluppo Rurale Integrato del Governo Programma. In sommario, il " progetto di pacco " comporta lavoro di dilazione a promuova produzione di vegetali, riso alto-flessibile, pesce, ed anatre; salute e famiglia che progettano; istruzione funzionale; e sviluppo cooperativo.

Il Sig. Attfield, l'autore č stato associato con VITA come un esperto Volontario e č l'autore di un numero di libri ed articoli, incluso Conigli che elevano, pubblicati da VITA. VITA č lieto di essere capace fare disponibile il lavoro di questo autore ed il programma eccellente del quale lui č una parte.

DECIDING COSA PER CRESCERE

Generally persone piantano i vegetali che a loro piace mangiare. Ma buono giardinieri dovrebbero considerare anche valore di cibo perché alcuni vegetali sono piů ricco nel valore che altri. Vegetali dovrebbero essere selezionati che č facile crescere sotto le condizioni di suolo locali, aggiunga ricchezza al suolo, e č resistente ad insetti e malattia.

vegetali Freschi sono una fonte eccellente di minerals e vitamine. Loro contengono molto del minerals, come calcio e stira che il corpo utilizza fare osso, denti e sangue. Loro provvedono anche vitamine importanti, principalmente la Vitamina Un, le vitamine di B, e Vitamina C.

Vitamina Un č avuto bisogno per occhi sani e visione buona. Una mancanza di questo vitamina puň provocare malattia di occhio e la cecitŕ pari fra bambini. Il meglio fonte di questa vitamina č vegetali verdi, frondosi e scuri, frutte gialle patata dolce e gialla, burro, uova e fegato.

Delle vitamine di B sono avute bisogno per pelle sana, occhi, nervi, e sangue buono. Una mancanza di queste vitamine sangue povero puň causare (l'anemia), la debolezza, pelle scagliosa ed asciutta gonfiando del corpo, ed anche salute mentale e povera. La fonte migliore di queste vitamine sono verdi. vegetali frondosi, pulsa (fagioli, piselli, soia nocciolina, dhal ecc.), crudo mano-controllň il peso o paritŕ-bollě (cucinato nella buccia) il riso, farina di grano intera (l'atta), carne e fegato.

Vitamina C aiuta prevenga infezioni, aiuta tagli e ferite a guarire rapidamente, e tiene le gengive circa i denti sano. La fonte migliore di questa vitamina č vegetali frondosi e verdi, guaiava, papaia, amlaki, arance e limoni.

Charts 1 e 2 show che vegetali sono il piů ricco e fonte piů povera di queste vitamine importanti e minerals. Un approvvigionamento regolare di vegetali freschi dal giardino salute buona e mangiando buoni possono volere dire per la famiglia intera.

CHART 1

GARDEN VEGETALI CHE CONTIENE MOLTE VITAMINE E MINERALS

Listed in ordine della loro ricchezza o valore di cibo. Articoli sottolineati mostra che parte del vegetale contiene il valore di cibo piů.

1. Black Colocasia lascia
2. Carota di, foglie e radice
3. La Rapa di lascia
4. La Barbabietola di lascia
5. Fenugreek lascia
6. Il Ravanello di lascia
7. Pigeon i piselli, tenero
8. Kohlrabi lascia
9. Coriandolo leaves
10. Spinach
11. Cowpea, lascia and

12. Soia, beans
13. Cavolfiore, flower
14. Broccoli
15. Foglie di Iuta (IL KOCHI ORHAR) (SHAK DI PATT)
16. Cavolo cappuccio cinese, (pata) di kochu di Krisno (pata di Ohonia) il pak-choy di e PE-TSAI
17. Indiani. OKRA (GAZOR) (SHAK DI PUEE) (DHEROSH)
18. Mais Dolce, (il pata) di Shalgom sbacella (Barboti) offre in pagamento d'un debito (Bhutta)
19. Verde. Piselli di (pata di Barbabietola) (Soia di kochi) (il Motore)
20. Fagioli francesi (pata) di Methi e lascia (Farash) (kopi Sciocco)
21. Spinacio
22. Patata di, foglie (shak) di Moola (il Broccoli) e tubero (ALOO DI GOL)
23. Pomodoro di (TOMETO)
24. Pointed la zucca, (shak) di Olkopi (shak di Palang) la zucca di e foglie (PATOL)
25. Patata Dolce (rosso)
26. Senape, arden V
27. A via e root (shak di Lai) (aloo di Misti, lal) che
28. Cipolla lascia
29. Field il fagiolo, tenero verde (pata di Piaj) (SHEEM)
30. Amaranth Rossi (shak di Lal)
31. Zucca Dolce
32. Fagiolo di Spada di , tenero va via (Misti
33. Amaranth Verdi (Makhon sheem) kumra shak) (SHAK) DI DANTA
34. Cavolo cappuccio
35. zucca Amara. gourd (Badha Kopi)
36. Zecca lascia e foglie (pata) di Pudina (Utchay e Karolla) L
37. a radice di Colocasia (MOOKHI)
38. Sedano lascia (shak) di Randuni
39. Lattuga, frondoso (pata) di Insalata

CHART 2

GARDEN VEGETALI CHE CONTIENE VITAMINE MOLTO POCHE E MINERALS Listed in ordine del loro valore di cibo

1. Melanzana
2. Cipolla, red
3. Zucca, yellow
4. Barbabietola root
5. Colocasia stem
6. Zucca flowers
7. Patata di Coco
8. Rapa root
9. Zucca di cenere (BEGOON) (KUMRA DI CHAL)
10. Piccolo. Radice di ravanello (PIAJ) (MOOLA)
11. Zucca di serpente (KUMRA DI HOLUD) (CHICHINGA)
12. Midollo vegetale (la Barbabietola) (Dhundul)
13. Imbottigli zucca (dati di Mukheer) (Lau)
14. Cetriolo (fool) di Kumra (Shosha e Kira)

15. Momordica c. (ALOO) DI CHUPRI (KAKROL)
16. Zucca di cresta (SHALGOM) (JHINGA)

CHART 3

VEGETALI DI FACILE CRESCERE E RICCO IN VITAMINE E MINERALS

1. Colocasia
2. Carota
3. Ravanello (per leaves)
4. Piccione Pea
5. Potato
6. Amaranth
7. Nero. Amaranth
8. Spinacio indiano
9. COWPEA
10. Soia
11. Dolce. Iuta
12. Rosso. Senape, garden
13. Verde. Fagiolo di campo
14. Okra
15. Zucca amara
16. Fagiolo di spada
17. Fagioli francesi
18. Zucca puntuta

LEARNING PER SEMINARE

Molti vegetali orto hanno stagioni che piantano tradizionali, come mostrato in Tabella 4. Mentre i mesi consueti per preparando la terra e seminare i semi sono durante inverno, dei vegetali possono essere piantati e possono essere cresciuti a pressocché alcuna durata. Per tenere un giardino che produce il tondo di anno, corretto orari che piantano hanno bisogno di essere stabiliti e seguirono. Il Calendario che Pianta

mostrato sulla pagina prossima stato usato in Sylhot. Questo calendario dovrebbe servire il giardiniere di casa solamente come una guida perché regioni geografiche e diverse avranno climi diversi. Ogni giardiniere dovrebbe diffondersi con locale variazioni in clima e prova tempi che piantano diversi. Solamente poi voglia lui sia capace di preparare un Calendario che Pianta basň sulle il condizioni climatiche di sue regione.

CHART 4

PLANTING CALENDAR FOR AMBARKHANA, SYLHET (KOTWALI THANA)

JANUARY	FEBRUARY	MARCH	APRIL
Amaranth Chinese cabbage Radish (for leaves) Spinach	Amaranth (red and green) Bitter gourd Eggplant Indian spinach Okra Sweet corn	Amaranth Ash gourd Bitter gourd Cowpea Eggplant Indian spinach Jute (sweet) Kakrol Okra Pepper (hot) Pointed gourd Sweet corn Sweet potato (for leaves)	Amaranth Ash gourd Bitter gourd Black colocasia Cowpea Cucumber Indian spinach Jute (sweet) Kakrol Okra Pepper (hot) Pointed gourd Ridge gourd Snake gourd Sweet corn Sweet potato (for leaves)
MAY	**JUNE**	**JULY**	**AUGUST**
Amaranth Ash gourd Black colocasia Cowpea Cucumber Indian spinach Jute (sweet) Kakrol Okra Pepper Pigeon pea Pointed gourd Ridge gourd Snake gourd Sweet corn Sweet potato (for leaves)	Amaranth Cowpea Indian spinach Kakrol Pigeon pea Pointed gourd Sweet corn	Amaranth Cowpea Field bean Kakrol Pointed gourd Radish Sword bean	Amaranth Broccoli Cabbage Cauliflower Field bean Kakrol Okra Pointed gourd Radish Sweet pumpkin Sword bean
SEPTEMBER	**OCTOBER**	**NOVEMBER**	**DECEMBER**
Amaranth Broccoli Cabbage Carrot Cauliflower Eggplant Field corn French bean Kohlrabi Mustard Okra Radish Spinach Sweet corn Sweet pumpkin Sword bean Tomato Turnip	Amaranth Beat Broccoli Cabbage Carrot Cauliflower Chinese cabbage Cucumber Eggplant French bean Garlic Kohlrabi Mustard Okra Onion Pea Pepper (hot) Radish Spinach Sweet corn Sweet potato Sweet pumpkin Tomato Turnip	Amaranth Beat Broccoli Cabbage Carrot Cauliflower Chinese cabbage Cucumber French bean Garlic Kohlrabi Mustard Onion Pea Pepper (hot) Radish Spinach Sweet corn Sweet potato Sweet pumpkin Tomato Turnip	Amaranth Beat Carrot Chinese cabbage French bean Mustard Pepper (hot) Radish Spinach Tomato Turnip

VEGETALI DI E LE LORO STAGIONI

Summer l'Inverno di il Tondo di l'anno

Zucca di Cenere di la Barbabietola di Mustard colosasia Nero

Broccoli di gourd Amaro la Cipolla di Cowpea

Iuta di la Carota di il Pisello di la Melanzana di

Kakrol Cavolfiore Pigeron Amaranto Verde

Pointed la zucca il Cavolo cappuccio di Radish spinacio indiano

Ridge il gourd cavolo cappuccio cinese lo Spinacio di Okra

Gourd di Serpente di Eseguono una battuta di rimando fagiolo fagiolo di Spada di Papper (caldo)

il fagiolo di French il Pomodoro di Amaranto Rosso

Kohlrabi Rapa patata Dolce

STEP-BY-STEP CHE FA DEL GIARDINAGGIO GUIDA

per avere successo in cibo crescente a casa, un po' di giardinaggio di base conoscenza č necessaria.

1 UBICAZIONE DI GIARDINO

Il giardino si dovrebbe localizzare dove riceverŕ sole la maggior parte del giorno. La sua taglia dipenderŕ da quello che sta essendo cresciuto e quanta durata stata disponibile per lavorare su lui. Un piccolo, bene gradirebbe giardino č piů produttivo che un grande, trascurň uno. Il giardino dovrebbe essere localizzato anche vicino la casa dove sarŕ piů conveniente per curare per e dove vegetali possono essere scelti poco prima che cucinando quando loro sono al picco della freschezza. Come il giardino avrŕ bisogno annaffiando a volte, dovrebbe essere vicino una fonte di acqua, come un stagni, canale. fiume, ringwell o tubewell. Delle persone sono state capaci a elevi alcuni vegetali che usano solamente l'acqua

sporca dalla cucina. Durante la stagione piovosa di acqua addizionale non sarŕ avuta bisogno. A questo punto, il giardino dovrebbe essere localizzato su terra che non č allagata. Suolo deve respirare aeri, e terra che č sotto acqua non fare cosě. Piante che crescono su molto bagnato terra crescerŕ lentamente e diventerŕ gialla. Come case la maggior parte di sono costruite leggermente su terra elevata, abbastanza spazio probabilmente puň essere trovato circa il bari per una famiglia giardino.

2 SCHERMA

Una volta un'ubicazione buona č trovata per il giardino, il passo prossimo č costruire un recinto forte per tenere fuori polli, capre e bestiame bovino. Č inutile per avviare un giardino finché questo č fatto. Scoperta di persone la maggior parte di che un recinto ha fatto di materiali locali č conveniente e soddisfacente. Molti giardinieri fanno i loro recinti con bambů; altri usano generi diversi di cespugli o rami con spine acute o spine dorsale. Alcuni giardinieri si guadagnano la vita permanente " recinga " piantando tipi certi di alberi o cespugli circa il orlo del giardino. Pisello di piccione (Orhar) fa un recinto buono, ed alla durata stessa produce cibo per la famiglia. Alcuni coltivatori in paesi altri usano manioca (Aloo di Shimla) per lo scopo stesso. Generalmente, gambi abbastanza grandi sono piantati chiuda insieme. Dopo che loro stanno crescendo bene, le cime sono tagliate di quando in quando via cosě i gambi crescono più forti e più spesso. Gli spazi tra i gambi sono chiuso con bastoni o pali di bambů. Persone che usano questi recinti sono capace raccogliere le radici di manioca su ogni lato del recinto per molti anni. Tipo purchessia di recingere č usato, deve proteggere il giardino da tutti gli animali circa la casa (Illustrazione 1).

3 CHE PREPARANO LA TERRA

Pressocché alcun tipo di suolo puň essere fatto per produrre vegetali gustosi. Se la terra circa la casa č giŕ fertile, il compito sia tenerlo fertile; se č molto povero, probabilmente vuole abbia bisogno di alcuno concime e forse del fertilizzante commerciale. Ma in casi la maggior parte della terra produrrŕ abbastanza vegetali senza pubblicitŕ fertilizzante. Chiaramente, il giardino deve essere in buono ordine e tenuto in condizione buon. Quando il suolo č in buono condizioni, č sciolto in tessitura e facile lavorare. Deve anche contenga molto cibo di pianta, il cibo che le radici assorbono alimentare il pianta intera. Il modo più buon di produrre queste due condizioni nel suolo č usi molto materiale organico, come concime animale, liquame e fango lo sweepings, immondizia di bazar, torta di petrolio macinata e pasto di pesce, giacinto di acqua decomporsi e composto. Composto č un tipo di fertilizzante fatto mescolando insieme foglie, erbe paglia, ceneri di legno, cowdung e materiali di spreco altri. Il Bollettino Tecnico di VITA N.ro 8 spiegano come composto che usa materiali trovati facilmente circa puň essere fatto il casa.

La zappa č un attrezzo conveniente per preparare la trama orto. Almeno due settimane prima di piantare, il suolo dovrebbe essere vangato o dovrebbe essere arato ad una profonditŕ di cinque ad otto pollici o più (Illustrazione 3). Dopo che il suolo č rotto cosě, esso dovrebbe essere vangato di nuovo molto giorni più tardi per fare i pezzi di terra più piccoli. Se c'č erba che cresce dove il giardino sarŕ messo, cura deve essere pressi tirare fuori tutta l'erba e radici di erba prima di piantare. Rompa l'erba e terra in pezzi piccoli con la zappa cosě loro possono essere alzati facilmente. Poi scuota tutta la terra via le radici di erba. Alcune radici di

erba sulle quali autunno deve essere scelto e remoto + loro avvieranno crescere di nuovo. Se ci sono molti pezzi di erba Morta e erbacce nel giardino, loro dovrebbero essere scavati nel suolo. Loro decomporsi piů tardi e faccia il suolo piů ricco. Erbacce viventi ed erba dovrebbero essere rimosse e piů tardi dovrebbero essere usate per composto.

Illustration 1. " innaffiamento Automatico: usando un tubewell e tubo di bambů.

Illustration 2. Un necessitŕ orto un recinto forte.

Illustration 3. Hoe o ara il suolo ad un dept di 5 - 8 pollici o piů.

Illustration 4. Use pali per marcare via la taglia del letto.

Illustration 5. Loosen il suolo con la Sua zappa.

Illustration 6. Add concime bene-radicato e materiali organici ed altri.

Illustration 7. Mix concimano bene nel suolo.

Illustration 8. Make i solchi (le fosse) lungo gli orli del letto.

Illustration 9. Smooth ed appiattisce la cima del letto.

Illustrazione 10. Un tumulo for piantando pronto.

che dei vegetali non cresceranno bene se il suolo nel giardino anche č siliceo o acido. Dei vegetali, come barbabietola che okra, spinacio, cipolla e lattuga sembrano crescere meglio quando cementa o ceneri di legno sono aggiunte al suolo orto. Un generale raccomandazione č diffondere 1/4 a 1/2 libbra (2 a 4 chattacks) di cementi (il chun) + ceneri di legno su ogni recinto quadrato di faccia del giardinaggio spazio, e poi lo scavi nel prima quattro o sei pollici di suolo. Dovrebbe essere ricordato che cementa non abbia spesso essere applicato, di solito una volta ogni anno o due saranno abbastanza.

4 AUMENTO IL SUOLO IN TUMULI DELL'OR DEI LETTI

Č possibile crescere vegetali su terra di appartamento, ma giardinieri la maggior parte di scoperta che piante crescono meglio se adulto su letti " in rilievo " o tumuli ". Generalmente, vegetali sono piantati su letti che sono due a tre piedi largo. La lunghezza puň essere corta come 10 piedi + finché 100 piedi. Se il giardino sarŕ mano-annaffiato usando un innaffiamento puň o pentola di terra, poi tutti i letti possono essere la taglia stessa, forse tre piedi largo e 10 piedi o piů in lunghezza. Se c'č un tubo-bene vicino, il giardino puň essere irrigato correndo acqua in giů i solchi (le fosse) tra i letti (l'Illustrazione 2). Se " solco-irrigazione " sarŕ praticata, il letto suggerito mette in ordine di grandezza dato in Tabella 7 dovrebbe essere seguito. Here č come fare i letti. Cominci legare ad un palo fuori i quattro angoli di il letto futuro (Illustrazione 4). Scavi sul suolo ed aggiunga alcuni bene-decomporsi (nero) concime alla percentuale di 4-6 libbre (2-3 veggenti) ad ogni tre piedi di piazza di spazio di letto (le Illustrazioni 5 e 6). Questo č un tempo buono per aggiungere alcuno altro materiale organico disponibile, come composto, giacinto di acqua bene-decomporsi, foglie bucce di riso e ceneri. Ora scavi bene il concime e materiali altri nel suolo (Illustrazione 7). Seguente, metta il suolo dal fuori orli della sequenza in il centro del letto. Questi formeranno scava tutti lungo il fuori del letto (Illustrazione 8). A questo punto concime piů bene-decomporsi o composto possono essere aggiunti alla cima del letto e scavň nella cima 3 a 4 pollici di suolo.

che fertilizzanti Commerciali possono essere usati se c'č una mancanza di concime animale o composto. In questo caso, 1/4 libbra (2 chattak) ognuno di Urea, TSP e Deputato possono essere usati per ogni letto 3 piedi largo e 10 piedi lungo. Il fertilizzante dovrebbe essere sparso uniformemente sulla cima del letto e scavň nella cima 4 pollici di suolo.

Finally, faccia che la cima spiani spingendo di nuovo ed avanti la terra con la zappa finché il letto sostiene 6 a 8 pollici sopra del livello della terra (Illustrazione 9). Durante il monsone molti giardinieri elevano la terra nei loro letti anche più alto, e qualche volta sostiene i lati dei letti con pezzi di divisione bambů e pali. Questo tiene l'acqua di eccesso esaurita dai letti e permette le radici della pianta per crescere forte e sano. Quando il lavoro č finito il letti dovrebbero essere lisci su cima senza pezzi grandi di terra per essere visto.

che dei vegetali possono essere cresciuti su tumuli circa gli orli del giardino, + in luoghi altri circa la casa. Idei 5 elenchi i vegetali che sono di solito cresciuto su tumuli. Con l'eccezione di annerisca colocasia, pisello di piccione e melanzana, queste piante sono tutte " le scalatrici " ed avranno bisogno di dei bastoni, bambů rami, un graticcio o anche una casa su che crescere.

per fare un tumulo, cominci scavare una buca 1-1/2 piedi profondo e 1-1/4 piedi largo. Seguente, riempa la buca con alcuni decomporsi concime, riduca in concime organico, o alcuno altro organico materiale disponibile. Aggiunga bene terra e miscela. Tumulo la terra su fino a che un piccolo collina č fatta. Flaten la cima e pigia in giů la terra nel medio per fare un labbro o si increspa tutti circa l'orlo di cima del tumulo (Illustrazione 10).

CHART 5

I VEGETALI DI PIANTŇ COMUNEMENTE SU TUMULI

Cenere gourd Cetriolo (*) Pointed la zucca

Melanzana di gourd Amara *Pigeon il pisello*

Black fagiolo di Campo di Colocasia zucca di Serpente di

Bottle il gourd spinacio indiano *fagiolo di Spada di

Cowpea *Kakrol la zucca di Sweet

Una " stella " dopo che un vegetale vuole dire puň sia piantato in tumuli o letti.

5 VOLTA PER PIANTARE

Dei vegetali sono facili crescere e possono essere piantati direttamente nei letti. Vegetali altri sono delicati e dovrebbero essere cominciato in una seme-scatola o seme-letto e più tardi si mosse (trapiantň) ai letti permanenti. Idei 6 show che i vegetali č facile piantare e quali il bisogno cura speciale.

CHART 6

VEGETALI DI CHE SHOULD SEED PER PIANTARE DIRETTAMENTE IN IL GIARDINO SIA TRAPIANTATO

Broccoli Cipolla di Colocasia Nera (le radici)

Cavolo cappuccio di Peas

Cauliflower pisello di Piccione di Beet

cabbage cinese zucca Amara Pointed la zucca

Eggplant Carrot Patato (il tubero)

spinach indiano il Ravanello di Coriander

Lattuga di Cowpea Amaranto Rosso

Senape di il Cetriolo di la Soia di

Pepper fagiolo di Campo di mais Dolce

Spinacio di fagiolo francese patata Dolce (i tagli) Pomodoro di Amaranto Verde

Iuta di zucca Dolce

Kohlrabi fagiolo di Spada di

Okra Rapa

Germinazione Prova. Qualche volta giardinieri seminano molti semi anche perché loro non sono sicuri se tutti i semi germoglieranno. Comunque, una germinazione semplice " prova " puň determinare la qualitŕ dei semi e puň indicare che percentuale dei semi crescerŕ. Conti fuori dieci semi e li porsi un bagnato fradicio pezzo di carta o stoffa (Illustrazione 11). Rotoli sulla carta o stoffa e metta una fine in una tazza riempita con un pollice di acqua (Illustrazioni 12 e 13). Quando i semi hanno avuto tempo per germogliare in quattro a dieci giorni, attentamente scartocci la carta e conti il numero di semi che hanno germogliato (germinň). Se otto fuori del dieci semi hanno germogli piccoli che crescono fuori di loro, questo indica che 80% dei semi sono buoni (Illustrazione 14).

Direct che Semina. Semi possono essere piantati direttamente nel giardino dal si " eserciti " metodo o il " metodo sparso ". Un " trapano " č un solco molto piccolo (incavo stretto) fece sulla cima del letto per piantare semi in una fila. Esso puň essere fatto con un pezzo puntuto di bambů o l'angolo di una zappa. Il trapano debba essere solamente lievemente piů profondo della taglia del seme. Alcuni giardinieri usi due pali ed un pezzo di sequenza tesi tra loro per tenere loro file diritto. Una volta i trapani sono fatti, i semi possono essere piantati e possono essere coperti con terra. Ricordi: una pianta probabilmente crescerŕ dovunque un seme č messo. Se i semi sono insieme troppo vicini, le piante non avranno abbastanza room a cresca grande e sano. Idei 7 show di quanto spazio č avuto bisogno tra ognuno pianti nella fila; dice anche quanti rema di piante puň essere piantato su ognuno letto. Se di due file sono avute bisogno, poi pianti una fila vicino ogni lato del letto, ma nessuno piů vicino di 4-5 pollici da ogni orlo. Sempre cominci piantare il due lati dei letti; se di una terzo o quarta fila č avuta bisogno, loro dovrebbero essere spaziato uniformemente tra i due fuori di file.

Illustrazione 11. Conto fuori dieci semi e li porsi un bagnato fradicio Pezzo di di carta o stoffa.

Illustrazione 12. rotola Attentamente sulla carta.

Illustrazione 13. Mise una fine della carta in un foggia a coppa riempito con un pollice di acqua.

Dopo quattro a dieci giorni, scartocci la carta e conta i semi che hanno germogliato.

CHART 7

PER IRRIGAZIONE DI SOLCO

I Vegetali di piantň File di on di piante la Distanza di

beds 24 pollice largo per letto tra pianta

Fagioli di , french due 8 "

Barbabietola di tre 4 "

Carota di tre 3 "

cabbage cinese due 12 "

Aglio di quattro 3 "

Kohlrabi due 6 "

Senape di , leaf due 8 "

Cipolla di tre-quattro 4 "

Piselli di , cespuglio two 8"-10 "

Ravanello di tre 3 "

Soia di due 4"-6 "

Spinacio di tre 6 "

mais Dolce due 8"-10 "

Rapa di tre 4 "

I Vegetali di piantň File di on di piante la Distanza di

beds 30 pollice largo per letto tra pianta

Broccoli di due 18 "

Cavolo cappuccio di , drumhead two 18 "

CAULIFLOWER TWO 18 "

Melanzana di due 18 "

Okra due 12 "

Pepper due 12 "

Pomodoro di due 18 "

Diventando calvo. Se le piante crescono troppo chiuda insieme una fila, esso sia necessario per rimuovere alcuni di loro cosě che ogni pianta ha abbastanza crescente stanza. Piante che spaziano sono propriamente rimuovendo altri called diventando calvo ". Esso non sembrare-raddrizzi tirare su poco piante che stanno crescendo bene, ma ha bisogno di qualche volta essere fatto. Con semi grandi, come piselli, fagioli e mais č abbastanza facile controllare come vicino insieme loro sono piantati. Piccolo semi, come amaranto e carota sono piů difficili spaziare perché loro rotolano via la mano come veloce come loro sono piantati.

Radiodiffusione di . Dei semi possono essere trasmessi (sparso) sul cima del letto, come mostrato in Tabella 8. Fare questo, prima faccia la cima del letto liscia. Poi trasmetta il seme e ditta loro nel suolo col indietro di una zappa. Se i semi ancora sono visibili dopo li avere pigiati in, rimuova un po' di immondizia dai solchi (le fosse) tra i letti per coprirli. Come le piante crescono, i letti possono essere diventati calvo molte volte per provvedere molto vegetali teneri. All'ultimo diventando calvo. sia sicuro per andare via abbastanza spaziale fra ogni pianta per la sua crescita corretta.

CHART 8

SEME DI CHE PUŇ ESSERE TRASMESSO

- Beet
- Piselli
- Carrot
- Ravanello
- Coriander
- Red Amaranto
- Amaranth Verde
- luta
- Dolce
- Lettuce
- Rapa

Seed la scatola. Vegetali per essere trapiantato sono cresciuti in " seme prima scatole " o un letto " di seme specialmente preparato ". Piů tardi, loro si sono mossi come piccolo piante ai letti orto, dove loro continuano a crescere fino a che raccolto. Un scatola di seme č una scatola piatta fatta di legno o bambů. Il fondo della scatola deve abbia fessure piccole o buchi tra gli assi per permettere acqua di eccesso di esaurire via. Il suolo nella scatola di seme puň essere una mistura di una parte bene-decomporsi cowdung (il concime) e due sabbia di parti (Illustrazione 15). Alcuni giardinieri usano un sporchi mistura di un suolo di parte, una parte decomporsi concime o riduce in concime organico, ed una parte sabbia. Sul fondo della scatola di seme, metta della paglia o erba asciutta per coprire il fessure e buchi, ma non abbastanza per fermare prosciugamento. In cima a questa paglia o ricopra d'erba, versi sulla mistura di suolo di scatola di seme ad un pollice del 1/2 dalla cima del inscatoli, e lo pigi in giů con un asse o da mano. Prima di seminare i semi nel scatola di seme, il suolo dovrebbe essere inumidito, o spruzzando, o lasciando il bancarella di scatola di seme mezzo la sua profonditŕ in una piscina di acqua finché il suolo assorbe abbastanza umiditŕ. Quando i semi sono sown, file possono essere fatte con un asse sottile, o con un bastone puntuto. Ogni fila dovrebbe essere due volte profonda come la taglia del seme, e 1-1/2 pollici

separatamente (Illustrazione 16). Poi il seme č coperto con sciolto suolo e pigiň dolcemente in giů. Se molti generi diversi di semi stanno essendo piantato in una scatola di seme. sia sicuro per marcare ogni fila o sezione della scatola in cosě un modo che i giovani pianta possono essere identificati quando loro germogliano (Illustrazione 17). La scatola di seme dovrebbe essere tenuta in un luogo ombroso finché i semi hanno germogliato. In la stagione asciutta, copra la scatola con della banana va via a tenere il suolo da asciugando fuori troppo veloce. Per tenere via formiche dai semi, gambe di luogo su la scatola di seme e mise questi in lattine o pentole di acqua.

Se solamente alcuni semi saranno piantati, usi una pentola floreale o poco profondo piatto di terra e gli prepara il modo stesso come una scatola di seme (Illustrazione 11).

Seed il letto. Giovani pianta possono essere cresciuti anche in un angolo di un letto orto. Dovrebbe essere localizzato su terra alta per permettere prosciugamento buono di acqua, e elevato 6 a 8 pollici sopra del livello macinato. Il suolo dovrebbe essere sciolto per crescita di radice buon. Se il suolo č pesante ed appiccicoso, aggiunga sabbia, cowdung e riso sguscia migliorarlo. Alcuni giardinieri aggiungono 1 chatak di TSP per ogni 15 ad angolo retto piedi di spazio di letto (3 piedi da 5 piedi). Qualche volta formiche tentano di rimuovere il semi. Prevenire questo il seme puň essere bagnato in kerosene e poi puň essere rotolato in ceneri.

Quando i semi rivestiti sono piantati, un poco più cenere puň essere sparsa su le file prima di coprirli finito con suolo. Qualche volta puň essere necessario a copra il letto di seme con stuoie mise su una cornice di bambů. Le stuoie proteggeranno i giovani pianta dal sole caldo e piogge pesanti. dopo che i semi hanno germogliato e sta crescendo, il letto di seme puň essere andato via scoperto, ometta durante il più caldo parte del giorno (10:00 sono a 3:00 pm), o quando avvia piovere.

Illustrazione 14. che Un seedbox ha preparato con una mistura di uno-parte bene-decomporsi concime (sterco di vacca) e sabbia di due-parti.

Illustrazione 15. Fa file pulite con un asse sottile o bastone puntuto.

Illustrazione 16. Mark le file cosě Lei riconoscerŕ il diverso Giovani pianta di quando loro germogliano.

Illustrazione 17. Tenta di ombreggiare i giovani pianta per 3 - 4 giorni dopo TRANSPLANTING.

Care di Giovani pianta. Innaffi giovani pianta di mattina presto. Quando giovani pianta sono annaffiati di sera, il suolo rimane l'umiditŕ e freddo in tutto la notte. Questo puň causare le piante tenere per divenire malaticcio, o decomposizione. Dopo due settimane che i giovani pianta possono essere messi in mostra a luce del sole piena. Questo causerŕ le piante per crescere più lentamente, ma loro cresceranno più forti e saranno migliori preparato per la vita nel giardino. Questa pratica č chiamata, mentre " indurendo " il giovani pianta.

Trapiantando. Ad approssimativamente tre settimane di etŕ i giovani pianta sono pronti per trapiantare. Innaffi la seme-scatola o seme-letto di fronte ai giovani pianta č estratto, cosě che il suolo sarŕ molle e loro non soffriranno da molte radici rotte. Un bastone piccolo o zappa possono essere usate per alzare attentamente i giovani pianta, mentre tenendo come molto suolo circa le radici come possibile. Sia sicuro

alzare il giovane pianta dalle foglie, non il gambo. Se il gambo č infured + schiacciň, il giovane pianta probabilmente morrŕ. Usando un bastone, scavi un poco profondo buchi nel letto orto ed attentamente metta il giovane pianta nel buco al profonditŕ stessa che stato nella seme-scatola. Pomodori possono essere piantati lievemente piů profondi, quindi alcuno del loro gambo č sotto la superficie del suolo. Ora il buco puň essere coperto e pigiň leggermente in giů da mano.

tenta di trapiantare in un giorno nuvoloso, o in ritardo di pomeriggio quando il sole non ha molto caldo. Tenti di non lasciare i giovani pianta nella seme-scatola + seme-letto troppo lungo. Piante che sono lunghe e sottili non cresceranno propriamente quando trapiantň al giardino. Alcuni giardinieri rimuovono le foglie piů basse di i giovani pianta alla durata di trapiantare. In cosě, meno acqua č perso attraverso le foglie, e la pianta recupera piů rapidamente.

Se un giovane pianta cade su, lo sostiene su e comprime il suolo circa il base della pianta.

Molti giardinieri buoni ombreggiano i loro giovani pianta trapiantati per alcuni giorni con un pezzo di gambo di banana (Illustrazione 18). Questa pratica č molta buono ed aiuterŕ le piante piccole a recuperare piů rapidamente dal colpo di trapiantando.

Tumuli. Vegetali crescenti su tumuli sono molto facili. La pratica comune fra giardinieri č piantare uniformemente tre o quattro semi in un cerchio piccolo spaziato. Dopo che le piante sono su, tutti ma la pianta piů forte č rimossa. 6 UNA ACQUA DI NECESSITŔ ORTO Dopo che i semi o giovani pianta sono piantati, loro devono essere annaffiato. Acqua pigerŕ dolcemente il suolo circa il semi o le radici dei giovani pianta. Ci sono due di base modi di innaffiare un giardino. Uno č con una lattina o di terra pentola che č usata spruzzare o versare acqua su e circa le piante. L'altro č mettendo acqua nei solchi (le fosse) tra i letti. Se c'č una fonte di acqua vicino, irrigazione " di " solco č il metodo preferibile. Acqua gettato in cima alle cause di letti il suolo sciolto per agglomerare e divenire duro. Alcuni vegetali, come cavolo cappuccio, pomodori e cavolfiore sono danneggiati quando acqua č spruzzato sulle loro foglie. In somma, quando la cima di un letto č bagnata, esso sembrare come abbastanza acqua č stato applicato; piů tardi puň essere scoperto che non c'era abbastanza acqua per arrivare in giů alle radici. Non solo solchi irrigazione assicura quell'acqua giungerŕ alle radici, ma arriva anche sotto le radici per tenere la supplire-suolo umido quale a turno proteggono il suolo superiore da asciutto-fuori.

Se c'č un tubo-bene vicino il giardino, una " fossa " di testata puň essere scavato connettere i solchi col bene quando il sistema irrigatorio č layed fuori. Un modo semplice di portare l'acqua dal bene alla fossa di testata č usare un tubo di bambů (Illustrazione 2). I solchi tra i letti devono essere livello fatto cosě che l'acqua non scappa prima che ha messo a bagno nel terra. Ogni giardiniere buono investiga la condizione del suolo frequentemente sotto la superficie. Scavando in giů alla profonditŕ delle radici di pianta con un bastone o zappa, č possibile vedere se il suolo č troppo bagnato o asciutto. Anche molta acqua spesso č come dannoso come non abbastanza acqua. Un approvvigionamento di umiditŕ di uniforme dovrebbe essere mantenuto durante la stagione crescente. Quando le piante sono

giovani giovani pianta, la cima due pollici (5 cm) dovrebbe essere tenuto umido. Piů tardi, la cima due pollici possono essere asciutti, ma i dieci pollici piů bassi (26 cm) dovrebbe essere tenuto umido.

In suoli di media (non troppo sabbioso), un il solco di cento piede puň essere riempito in dieci minuti pompando continuo con un normale tubo-bene pompa di mano. Se annaffiando propriamente č fatto. non deve essere ripetuto per dieci giorni o due settimane, ma questo dipende da condizioni di giardino individuali. Giardinieri buoni ci dica che il tempo migliore per innaffiare il giardino č in ritardo di pomeriggio, quando il sole č basso.

7 CHE GRADISCONO LE NECESSITŘ DI LE PIANTE

Giardinieri hanno imparato modi molti di aiutare le loro piante crescono forte e sano. Ecco alcune pratiche che miglioreranno un giardino.

Weeding. Dopo avere piantato un raccolto vegetale, accurato deve essere osservato per settimane. Rimuova erbacce da mano quando le piante sono piccole, piů tardi questo puň essere fatto con una zappa. Alcuni giardinieri mettono al corrente contro allentare il suolo con un zappi, specialmente durante la stagione asciutta. Loro dicono che questo cause la cima-suolo per asciugare piů rapidamente fuori. e qualche volta i danni la pianta radici.

Mulching. Per il giardiniere che vuole fare lavoro piů facile, mentre ripulendo dalle erbacce puň sia ridotto da " mulching ". Mulching č la pratica vecchia di mettere sciolto organico materiale, come paglia, erba asciutta, foglie, giacinto di acqua decomporsi o bucce di riso sulla superficie dei letti, circa le piante e tra le file (l'Illustrazione 19). Tre a quattro pollici di strame terranno in giů la crescita di erbacce e erba. Durante il monsone lo strame proteggerŕ il suolo dal lavare via. Nella stagione asciutta, lo strame impedirŕ al sole di asciugare il suolo e salvataggi acqua irrigatoria. Anche nei giorni piů caldi, se lo strame č alzato il sporchi sotto sarŕ trovato essere umido e fresco. Dopo due o tre mesi lo strame decomporsi, e puň essere mescolato nei letti per fare il giardino piů fertile.

che piante di Pomodoro di Staking. sono allacciate a bambů o pali di legno di solito con cordicella molle o stoffa per prevenire i rami e fruttificare dal toccare il suolo. Se a piante di pomodoro č permesso per giacere sul suolo, molta della frutta puň decomporsi, o sia danneggiato da insetti e lumache. Piante di pomodoro possono essere allacciate a pali nel giorno stesso come trapiantando. Si guardi bene da tagliare il gambo seppellito o radici come il palo sono spinte nel suolo. Una striscia di stoffa č migliore per tying il gambo al palo. L'allacci ermeticamente circa il palo, ma scioltamente e dolcemente circa il gambo.

Alcuni giardinieri lasciarono i loro pomodori crescere liberamente su un strame che copre il cima del letto. Questo non permette alla frutta e rami di toccare il suolo senza l'uso di pali.

Stopping Growth. Un'altra pratica con pomodori č potare " (la scelta via) i " succhiatori ". Succhiatori sono gambi piccoli e foglie dalle quali crescono il base di gambi piů grandi (Illustrazione 20). Rimuovendo i succhiatori riduce l'ammontare della crescita di foglia, ed incoraggia piů frutta per essere prodotta. Vegetali altri piaccia zucche, zucche di bottiglia, zucche di cenere, e cetrioli, puň essere potato in un modo simile. Quando troppo il concime (sterco di vacca) č usato nel giardino,

vegetali cresca molte foglie, ma frutta molto piccola. Correggere questo, scelga via il punte crescenti e ricce, verdi dalle viti. Questo fermerŕ la pianta dal prendere su troppo spazio orto, e lo costringe a produrre piů frutta.

Cetrioli di Plants. Rampicanti, spinacio di indian, cowpeas, e zucche amare abbia bisogno di qualche genere di scalare appoggio. Giardinieri la maggior parte di usano poli o bambů rami. Spinacio indiano e cetrioli sono allacciati agli appoggi con spesso strisce di stoffa.

Un graticcio (il macha) puň essere costruito per zucche. fagioli di campo, fagioli di spada zucche puntute e zucche amare. Molti di questi vegetali cresceranno esattamente su un recinto o il tetto di una casa. Un graticcio puň essere fatto dovunque, ma un buono ubicazione č vicina il fuori orli di un giardino. In cosě, spazi nel giardino sarŕ salvato per piantare vegetali altri (Illustrazione 1).

Manure Tea. Se vegetali frondosi crescono lentamente e hanno verde leggero o foglie di giallo, loro probabilmente hanno bisogno di fertilizzante. Tč " di " concime č un liquido buono fertilizzante fece da concime fresco (sterco di vacca) ed acqua. Č fatto facilmente mettendo due o tre handfulls di concime fresco in un secchio, suoni sul tamburo, o pentola di terra e riempendolo con acqua. Mescoli la mistura di quando in quando ed impedimento siede per una settimana. Prima di usare il liquido, lo diluisca con piů acqua fino a che č il colore di tč debole. Dopo avere innaffiato il giardino, il tč puň essere versato, circa la base di ogni pianta.

CHART 9

GIVE TČ DI CONCIME A VEGETALI FRONDOSI

Black Iuta di colocasia

Cabbage Senape, giardino

Ravanello di cabbage cinese (per foglie)

Amaranth Verde Amaranto Rosso

Spinacio di spinach indiano

8 OSSERVARE PER INSETTI E MALATTIA

*La maggior parte degli insetti che affliggono piante orto possono essere controllato senza l'uso di insetticidi. Mentre la maggior parte di gardenera č consapevole che rospi, ragni, e degli uccelli mangiano insetti, č non come saputo estesamente che i nemici naturali notevoli di un insetto sono insetti altri. Č probabile che questi nemici naturali siano chiamati " caccia insetti " perché loro passano la maggior parte del loro tempo che guarda per pesti per mangiare. Alcuni degli insetti di caccia mangiano molto loro predi ad una durata; altri, come le mini-vespe uova laiche su un il corpo di insetto che lo causa per morire. Quando un insetticida č usato per controllare un peste, il problema č fatto spesso peggiore uccidendo i nemici naturali della peste-- gli insetti di caccia. Una pianta che č trattata con un insetticida puň avere il peste stessa indietro alcuni settimane piů tardi solamente questa durata in numeri piů alti che prima. Quello che accadde č che i nemici naturali della peste furono uccisi accidentalmente via insieme alla peste. Č possibile

uccidere tutte le pesti di insetto raramente. Senza alcuni insetti di caccia per tenerli in controllo, quelli che non sono morti o quelli che hanno volato in da un recinto vicino, era capace di moltiplicare senza restrizione.

Come giardinieri buoni, č importante per non sconvolgere gli equilibri naturali che esista tra peste e " cacciatore ". Le pesti di giardino piů comuni sono mostrate in Illustrazione 21. Tutte di queste pesti sono facili rimuovere da mano. Bruchi e cimici possono essere scelte via, mentre afidi possono essere schiacciati da una mano lungo il gambo.

*Adapted da un articolo di Helga e Bill Olkowski, Esperti del Controllo della Peste, California, U.S.A

Insetti piccoli, molli possono essere tolti con acqua insaponata e mite, o spolverň con ceneri di legno. Non č necessario per trovare tutte le pesti. Il poco che č andato via dietro a sarŕ maneggiato dai loro nemici naturali.

piante Sane possono superare le possibilitŕ del sistema danno di insetto di solito, e loro sono piů resistente a malattia. Se suolo fertile e ricco e semi forti sono usati, e cura corretta si č presa, poi piante non diventeranno spesso ammalate. Qualche volta, comunque, una pianta diventa molto ammalata. Dovrebbe essere guardato attentamente e dovrebbe essere rimosso dal giardino se sembra la malattia sta spargendo a piante altre. Se una malattia seria attacca un raccolto di pianta, chieda al Thana Ufficiale Agricolo per consiglio. Lui puň dirgli cosa per fare di solito, di che genere di medicina č avuto bisogno, e dove Lei puň trovarlo.

9 VOLTA PER RACCOGLIERE Qualche volta vegetali comprati al mercato sono vecchi e insaporo. Questo č perché molti coltivatori raccolgono il loro raccolto prima che č maturo, e poi lascia i vegetali sedere circa troppo brami prima di venderli. In un giardino di casa vegetali si possono raccogliere quando loro sono maturi e gustosi. Sapere quando vegetali sono Solo diritti per scegliere č qualche cosa imparato con esperimenta. Loro dovrebbero essere scelti poco prima che cucinando perché assaggia e valore di cibo comincia diminuisca appena un vegetale č raccolto. Il segreto a trovando piů cibo da un giardino č scegliere tutto appena č pronto per mangiare. Il piů che č raccolto, il piů un orto produrrŕ. Esempi buoni č senape e spinacio. Se l'esterno, foglie piů grandi sono tagliate come continuamente le piante crescono, tanti quanti cinque raccolti possono essere ottenuti in una stagione.

foglie di patata Dolci sono uno dei vegetali pochi che possono essere raccolti ogni mese dell'anno. La vite tenera fornisce di punta assaggi buono, e loro č ricco in vitamine e minerals. Se viti sono piantate verso la fine di inverno. ci saranno molte punte e gambi teneri da raccogliere ogni estate lungo quando vegetali frondosi ed altri sono in approvvigionamento corto.

CHART 10

HARVEST QUESTI VEGETALI SPESSO

Beat foglie di Iuta di leaves

zucca leaves Senape foglie Amare

Black colocasia leaves Okra, frutte tenere

Cavolo cappuccio di , leaves esterni Aguzzarono foglie di zucca

Cavolfiore di , foglie di Ravanello di leaves esterne

cavolo cappuccio cinese, foglie di Spinacio di leaves esterne

Cowpea, punte e pods teneri patata Dolce fornisce di punta (6 ")

Field il fagiolo, pods tenero punte di zucca Dolci

fagiolo francese, fagiolo di Spada di pods tenero, bacelli teneri

leaves di Amaranto Verde foglie di Amaranto Rosse

spinacio leaves Rapa foglie indiane

10 PIANTA DI NUOVO

Per provvedere un'abbondanza di cibo un giardino deve mai non sia maggese sinistro. Appena un vegetale č raccolto, un altro dovrebbe essere piantato. " Successione piantando " č il piantare di alcuni vegetali ogni due o tre settimane durante la stagione crescente. Cosě il raccolto non venga tutto in una volta, ma piuttosto su un periodo lungo di tempo. Tempi che piantano diversi dovrebbero essere tentati anche di determinare quali vegetali crescono meglio e come estendere il loro piantando stagioni. Il costume vecchio di piantare tutto alla durata stessa dovrebbe essere evitato. Un esempio buono č okra. Piantando un raccolto intero di okra al tempo stesso, tutto matura alla durata stessa e non puň essere mangiato. Poi due settimane non c'č piů tardi nessun okra tenero andato via nel giardino. Praticando " successione piantando, " una fila di okra č piantata una settimana, un'altra fila tre settimane piů tardi, e cosě su finché quattro o piů file sono state piantate. Questo provvedrŕ un buono approvvigioni di okra per molti mesi in successione.

Companions. There Buoni sono molte combinazioni di vegetali che cresca bene quando piantň lato-da-lato nella fila stessa o letto. Dei vegetali cresca piů veloce di altri. Se cresciuto insieme, un vegetale puň essere raccolto e fuori del modo mentre l'altro continua a crescere. Idei 11 mostra alcuni combinazioni che sarebbero provate nel giardino. Se ambo i vegetali non sono piantato alla durata stessa, il vegetale prima elencato prima dovrebbe essere piantato.

Saving Seed. č spesso desiderabile per salvare i semi da giardino piante vegetali. Semi possono essere raggruppati facilmente da tutti i vegetali elencato in Tabella 12. Loro dovrebbero essere immagazzinati in contenitori aria-stretti. Bottiglie faccia contenitori di seme buoni ma loro abbiano bisogno di essere asciugati completamente nel sole prima di riempire. Propriamente tappi le bottiglie ed immagazzini in un luogo asciutto.

* Zucche, cetrioli e pumpkins: Prendono semi da un esattamente sagomato, frutta di mezzo-taglia che č stata scelta da una vite sana. Quando č completamente maturo, pesti la carne con acqua e lasci che la mistura stia in piedi per molti giorni. Piů tardi, la polpa ed acqua č versata via ed i semi asciugarono su una superficie piatta.

* Tomatoes: Pick frutta molto matura, bene-formata da sano, forte piante. Pesti completamente i pomodori in un piccolo metta in vaso o. Riempa la pentola con acqua e lasciň la mistura stare in piedi per un paio di giorni. La volontŕ di polpa stia

a galla alla cima e puň essere versato via con l'acqua, mentre lasciando i semi su il fondo. Li lavi in acqua fresca e sparga asciugare su una superficie piatta.

* Beans: Simply selezionano le piante migliori e vanno via intatti quando il resto del raccolto č raccolto. Quando i bacelli sono marroni e completamente asciugano, apra fuori i semi e li salvi per stagione prossima.

* Amaranth: Select le piante piů sane e li lascia nel giardino finché semi sono prodotti sui rami di cima della pianta. Di fronte al " seme teste " divenute troppo asciutto, raccolga le cime e li asciugi su un pezzo di carta o carrello. Rimuovere i semi, strofini le teste di seme asciutte tra due dita.

* il Mais: Select i piů primi ed orecchi migliori e permise loro di maturare sul cammini impettito. Piů tardi, si spogli di nuovo le bucce ed appenda i cigno maschio pieni in un luogo asciutto. Quando i noccioli hanno asciugato completamente, li hanno aperti fuori e li hanno immagazzinati per futuro piantando.

CHART 11

CHE QUESTI VEGETALI FANNO DI COMPAGNI BUONI

Cavolo cappuccio di ed il Mais di Radishes e Spinacio

Cavolo cappuccio di e l'Iuta di Amaranth ed Amaranch

Cavolo cappuccio di e Lettuce Onions e Ravanelli

Carote di ed i Piselli di Radishes e Carote

Cowpea ed i Ravanelli di Amaranch ed Amaranto

Cowpea ed indiano spinach Pomodori ed Amaranto

Mais di ed i Pomodori di Mustard e Ravanelli

CHART 12

SAVE SEME DA QUESTI VEGETALI

gourd Amaro Okra

cavolo cappuccio cinese (Piselli di Pe-tsai)

pisello di Piccione di Cowpea

Cucumber Pointed la zucca

Eggplant Amaranto Rosso

Field bean si Increspano zucca

fagiolo francese lo Spinacio di

zucca di Serpente di Amaranth Verde

spinach indiano mais Dolce

Jute zucca Dolce

fagiolo di Spada di Kakrol

Mustard Pomodoro

PLANTING LE DIREZIONI PER CIASCUNO VEGETALE

Ogni vegetale ha le condizioni certe sotto che esso cresce meglio. Il listato alfabetico e seguente provvede istruzioni che piantano semplici per molti vegetali orto. č voluto dire solamente come una guida; un ammontare certo della sperimentazione sarŕ necessario per accomodare suolo locale e Condizioni del tempo di . Ciononostante, provvede il Giardiniere di con un punto iniziale e buono per elevare una varietŕ di faccia del giardinaggio vegetali.

Amaranto di (LAL E DANTA SHAK) <veda; ritratto 1>

Time: che pianta Alcun mese

Sporchi Condition: Alcuno suolo contenendo alcuni riducono in concime organico o atterriscono sterco.

Spaziando: 3 " - 4 " tra piante

Profonditŕ per Piantare Seed: 1/4 pollice

Giorni a Germination: 4 - 6

Istruzioni che piantano: Trasmetta sul seme letti bene-preparati. Copra leggermente con suolo, poi innaffi il letto.

Cura: Tenga il suolo umido finché i semi sono germinati. Cominci a diventare calvo quando il piante sono 2 a 3 pollici alto. Tenga i letti ripuliti dalle erbacce. Dia tč di concime per promuovere crescita di foglia.

Raccogliendo: Scelga le foglie per prolungare il periodo di raccolto spesso. Le foglie sono un fonte eccellente di vitamine e minerals. Raccolta di seme č facile.

Cenere Zucca <veda; ritratto 2>



Marzo di Time: che pianta, aprile, maggio

Sporchi Condition: Alcuno suolo contenendo ammontari generosi di materiale organico (sterco di vacca, riduca in concime organico, ecc.)

Spaziando: 2 - 3 giovani pianta per tumulo 12 " tra tumuli

Profonditŕ per Piantare Seed: 1/2 " - 1 "

Giorni a Germination: 6 - 12

Instructions: Plant che pianta cinque a sei semi su un tumulo. Quando i giovani pianta sono su, rimuova tutti ma le due o tre piante migliori.

Care: Questo vegetale č un scalatore attivo, cosě č migliore permettergli di crescere su un albero o il tetto di una casa. Altrimenti, dovrebbe essere allacciato a dei rami o cresciuto su un graticcio.

Harvesting: Le prime frutte saranno pronte per mangiare dopo approssimativamente 3 mesi. Il foglie verdi e punte di gambo fanno un vegetale gustoso, ricco in vitamine e minerals. Raccolta di seme č facile.

Barbabietola di <veda; ritratto 3>

Ottobre di Time: che pianta a dicembre

Suolo Condition: suolo Sciolto, sabbioso contenendo del materiale organico (Decomporsi concime, riduca in concime organico, ecc.)

Spacing: 8 " - 12 " tra file 4 " - 5 " tra piante

Profonditŕ per Piantare Seme: 1/2 pollice

Giorni a Germination: 5 - 7

Instructions: che pianta Il Seme puň essere piantato in file o puň essere trasmesso sulla cima del letto.

Care: Se il seme č trasmesso, i giovani pianta dovrebbero essere diventati calvo fuori fino a che le piante č separatamente 4 a 5 pollici. Tenga i letti umido.

Foglie di Barbabietola di Harvesting: sono ricche in vitamine e minerals e piuttosto gustoso. La radice č pronto mangiare 2 a 3 mesi dopo avere piantato.

Zucca Amara (KAROLLA) <veda; ritratto 4>

Febbraio di Time: che pianta, marzo Aprile di



Sporchi Condition: Alcuno suolo contenendo un ammontare generoso di materiale organico, (sterco di vacca, riduca in concime organico, ecc.)

Spacing: 2 giovani pianta per monte 3 piedi tra tumuli

Profonditŕ per Piantare Seed: 1/4 " - 1 "

Giorni a Germination: 8 - 12

Instructions: Plant che pianta tre o quattro semi su un tumulo. Piů tardi rimuova tutti ma le due piante che guardano piů forti.

Care: che Un graticcio di bambů puň essere costruito per le viti per scalare. Questo č un vegetale buono piantare vicino l'orlo del giardino, dove le viti possono crescere sul recinto.

Harvesting: Le zucche sono pronte per raccogliere 3 mesi dopo avere piantato. Il verde foglie e punte di gambo fanno un vegetale gustoso, ricco in vitamine e minerals. Seme raccolta č facile.

Black COLOCASIA (KRISNO KOCHU) <veda; ritratto 5>

Aprile di Time: che pianta e maggio

Sporchi Sandy di Condition: suolo ricco in materiali organici (il composto, concime bene-decomporsi, ecc.)

Spacing: 1 pianta per monte 1 - 2 piedi tra tumuli

Profonditŕ per Piantare Root: 2 - 3 pollici

Giorni a Sprouting: 5 - 7

Instructions: Plant che pianta un pezzo di radice (radice-penetrante) in ogni tumulo. Qualche volta piante giovani con radici piccole sono piantate.

Care: Keep il suolo umido, ma non troppo bagnato. Prosciugamento buono č importante. Luogo terra vicino la base dei gambi quattro a cinque volte all'anno. Rimuova alcuni gambi marci.

Harvesting: Harvest le foglie ed i gambi. Le foglie sono un eccellente fonte di vitamine e minerals. Piante continueranno a produrre anno dopo anno.

Broccoli di <veda; ritratto 6>

Agosto di Time: che pianta a novembre

Sporchi Sandy di Condition: suolo contenendo ammontari generosi di materiale organico (sterco di vacca, riduca in concime organico, ecc.)

Spacing: 24 " tra file 18 " tra piante

Profonditŕ per Piantare Seed: 1/4 pollice

Giorni a Germination: 3 - 4

Instructions: Plant che pianta seme in un seedbox o seedbed. Trapianti quando il seedings sono 2 pollici alti, approssimativamente 4 a 5 settimane dopo avere seminato.

Care: Alcuni giardinieri ombreggiano i giovani pianta per i primi 3 a 4 giorni dopo avere trapiantato. Letti possono essere mulched per tenere il suolo umido e controllare la crescita di erbacce. Dia fertilizzante liquido (tč di concime) molte volte durante la stagione crescente.

Harvesting: Cut la prima testa prima che i fiori gialli e piccoli cominciano ad aprire. Più teste saranno Prodotte. Il più teste che sono scelte, il più la volontŕ di pianta produzione.

Cavolo cappuccio di <veda; ritratto 7>

Agosto di Time: che pianta attraverso Ottobre di

Sporchi Condition: Alcuno suolo contenendo ammontari generosi di materiale organico (il cowdung, riduca in concime organico, ecc.)

Spacing: 24 " tra file 18 " tra piante

Profonditŕ per Piantare Seed: 1/4 pollice

Giorni a Germination: 4 - 9

Instructions: Plant che pianta seme in un seedbox o seedbed. Trapianti i giovani pianta approssimativamente 15 a 20 giorni dopo avere seminato.

Care: Molti giardinieri ombreggiano i loro giovani pianta per i primi 3 a 4 giorni dopo avere trapiantato. Letti possono essere mulched per conservare acqua.

Harvesting: Le teste sono pronte mangiare 3 mesi dopo avere piantato. Scegliendo di presto il foglie esterne prolungheranno il periodo di raccolto.

Carota di <veda; ritratto 8>

Time che pianta: Settembre a dicembre

Condizione di suolo: Un suolo sabbioso e sciolto. Eviti troppo sterco di vacca ed altro concimi. Composto puň essere usato.

Spacing: 6 " - 8 " tra file 2 " - 3 " tra piante

Profonditŕ per Piantare Seme: 1/4 " - 1/2 "

Giorni alla Germinazione: 7 - 12

Istruzioni che piantano: Semi possono essere sown in file o possono trasmettere sul letto. Semi possono essere messi a bagno in acqua per 12 ore per andare a tutta velocita' la germinazione.

Cura: Diventando calvo dovrebbe essere fatto 7 - 10 giorni dopo la germinazione. Un secondo diventando calvo possono sia fatto quando le foglie sono circa 4 pollici alto. Troppo sterco di vacca provoca carote essere deformato radici.

Raccogliendo: Le carote giovani possono essere raccolte 2 mesi dopo avere piantato. Piů grande radici sono pronte mangiare in 3 mesi.

Cavolfiore di <veda; ritratto 9>

Agosto di Time: che pianta a novembre

Sporchi Condition: Alcuno suolo contenendo ammontari generosi o materiale organico (il composto, concimi, ecc.)

Spacing: 24 " tra file 18 " tra piante

Profonditŕ per Piantare Seme: 1/4 " a 1/2 "

Giorni alla Germinazione: 3 - 6

Istruzioni che piantano: Seme di pianta in un seedbox o seedbed. Trapianti i giovani pianta a letti permanenti dopo 15 giorni.

Cura: Quando giovani pianta sono messi fuori, pigi ermeticamente il suolo circa le radici. Alcuni giardinieri ombreggiano i giovani pianta per i primi 3 a 4 giorni dopo avere trapiantato. Letti essere mulched per tenere il suolo umido e controllare la crescita di erbacce.

Raccogliendo: Pronto mangiare 3 a 4 mesi dopo avere piantato. Le foglie verdi ed esterne fanno un vegetale gustoso.

Cavolo cappuccio cinese (PE-TSAI) <veda; ritratto 10>

Time che pianta: Ottobre-gennaio

Suolo Condition: Mix molto materiale organico nei letti.

Spacing: 16 " - 18 " tra file 12 " tra piante

Profonditŕ per Piantare Seme: 1/2 pollice

Giorni alla Germinazione: 3 - 5

Istruzioni che piantano: Semi di pianta in un seedbox o seedbed. Trapianto quando giovani pianta č 15 a 20 giorni vecchio. Cresca su letti in rilievo.

Cura: Della molta umiditŕ nel suolo č avuta bisogno per la crescita. Molto strame di giardinieri il letti. Dia fertilizzante liquido (tč di concime) molte volte durante la stagione crescente.

Raccogliendo: Il vegetale č pronto fra due mesi dopo avere seminato. Tagli e mangi le foglie esterne per prolungare il raccolto. Raccolta di seme č facile.

COWPEA <veda; ritratto 11>

Time che pianta: Marzo a luglio

Condizione di suolo: Any sporca contenendo ammontari generosi di materiale organico (il composto, concimi, ecc.)

Spacing: 2-3 piante per tumulo 2 piedi tra tumuli

Profonditŕ per Piantare Seme: 1/2 " - 1 "

Giorni alla Germinazione: 4 - 5

Istruzioni che piantano: Pianti quattro a cinque semi su un tumulo. Più tardi, rimuova tutti ma lo srongest due o tre piante. Semi possono essere piantati anche in file (6 pollici tra piante, 2 - 3 piedi tra file) o trasmise sulla cima del letto.

Cura: Provveda un ramo grande o graticcio per le piante per scalare. Guardi per piccolo insetti sui fagioli teneri. Spolveri con ceneri, se necessario.

Raccogliendo: I fagioli giovani sono pronti mangiare cinque ad otto settimane dopo avere piantato. Il verde lascia e tenero scaturisca punte fanno un vegetale buono, ricco in vitamine e minerals. Raccolta di seme č facile.

Cetriolo di <veda; ritratto 12>

Time che pianta: Aprile - maggio Ottobre di - novembre

Condizione di suolo: Suolo che contiene un ammontare generoso di materiale organico (sterco di vacca, riduca in concime organico, ecc.)

Spacing: 2 - 3 piante per tumulo 2 - 3 piedi tra tumuli

Profonditŕ per Piantare Seme: 1/2 " - 1 "

Giorni alla Germinazione: 4 - 8

Istruzioni che piantano: Pianti cinque a sei semi su un tumulo. Quando i giovani pianta č su, rimuova tutti fuori le due a tre piante migliori.

Cura: Durante la stagione di inverno, cetriolo puň essere cresciuto su tumuli di mulched o letti. Nel monsone, allacci le viti ad un ramo o graticcio per tenere le piante via il terra.

Raccogliendo: Raccolga le frutte quando 4 a 6 pollici lungo, approssimativamente 3 mesi dopo piantando. Scelga le frutte per prolungare il raccolto spesso. Raccolta di seme č facile.

Melanzana di <veda; ritratto 13>

Time che pianta: Febbraio, marzo Settembre ed ottobre

Condizione di suolo: Cresce bene su sabbioso suolo che contiene materiale organico.

Spacing: 24 " - 36 " tra file 18 " - 24 " tra piante

Profonditŕ per Piantare Seme: 1/2 pollice

Giorni alla Germinazione: 6 - 14

Istruzioni che piantano: Semi di pianta in un seedbox o seedbed. Trapianti quando il giovani pianta sono 4 " a 5 " alto, approssimativamente 15 giorni dopo avere seminato. Piante possono essere cresciute su letti o tumuli.

Cura: Quando le piante sono un piede alte. loro dovrebbero essere sostenuti con un bastone. Annaffi ogni sette a dieci giorni e dia fertilizzante liquido (tč di concime) una volta o due volte di fronte ai fiori di pianta.

Raccogliendo: Le frutte giovani saranno pronte mangiare approssimativamente 10 settimane dopo avere seminato. Scelga le frutte per prolungare il raccolto spesso. Raccolta di seme č facile.

Field il Fagiolo (SHEEM) <veda; ritratto 14>

Time che pianta: Luglio, agosto Settembre di

Condizione di suolo: Alcuno suolo contenendo ammontari generosi di materiale organico (il composto, concimi, foglie decomporsi)

Spacing: 1 - 2 piante per tumulo 4 - 6 piedi tra tumuli

Profonditŕ per Piantare Seme: 1/2 " - 1 "

Giorni alla Germinazione: 3 - 5

Istruzioni che piantano: Pianti quattro a cinque semi su un tumulo. Piů tardi, rimuova tutti ma uno o due giovani pianta.

Cura: Molto strame di giardinieri i tumuli dopo che i giovani pianta sono germinati. Orologio per danno di insetto sui fiori e fagioli teneri. Spolveri con ceneri, se necessario. Provveda un ramo grande o graticcio per piante per scalare.

Raccogliendo: Fagioli sono pronti mangiare approssimativamente 10 settimane dopo avere piantato. Scelga i fagioli spesso prolungare il raccolto. Raccolta di seme č facile.

Fagiolo francese <veda; ritratto 15>

Time che pianta: Settembre a dicembre

Condizione di suolo: Mescoli molto materiale organico nel suolo (il composto, concimi, ecc.). Letto dovrebbe essere esaurito bene.

Spacing: 10 " - 18 " tra file 6 " - 8 " tra piante

Profonditŕ per Piantare Seme: 1 pollice

Giorni alla Germinazione: 3 - 5

Istruzioni che piantano: Semi possono essere piantati in rema o trasmise.

Cura: A fagioli non piace suolo che č troppo bagnato. Molto strame di giardinieri i letti per conservare sporchi l'umiditŕ e controlli la crescita di erbacce. Guardi per insetto danneggia sul fiori e fagioli teneri. Spolveri con ceneri, se necessario.

Raccogliendo: Fagioli sono pronti mangiare approssimativamente 10 settimane dopo avere piantato. Scegliendo frequente prolunghi il raccolto. Raccolta di seme č facile.

Aglio di E Cipolla <veda; ritratto 16>

Time che pianta: Ottobre - novembre

Condizione di suolo: Bene-esaurito, sabbioso sporchi, mentre contenendo materiale organico

Spacing: 7 " - 12 " tra file 3 " - 4 " tra piante

Profonditŕ per Piantare Seme: 1/4 pollice

Giorni alla Germinazione: 5 - 12

Istruzioni che piantano: Vuole troppo molto tempo per crescere aglio da semi. Si divida separatamente un aglio vecchio in chiodo di garofano (bulbi piccoli). Pianti ogni chiodo di garofano 1-1/2 pollici profondo nel letto orto. Cipolla di ammollo semina in acqua per 12 ore. Pianti il seme in un seedbox o seedbed. Quando i giovani pianta sono 3 a 4 pollici alto, trapianti ai letti orto.

Cura: Tenga il letto libero di erbacce. Alcuni giardinieri allentano una volta o due volte il suolo un settimana.

Raccogliendo: Quando la svolta di foglie marrone (3 - 4 mesi), attentamente scavi sui bulbi e li asciuga nel sole per alcuni giorni. Li immagazzini in un luogo fresco, asciutto. Spinacio indiano <veda; ritratto 17>

Time che pianta: Alcun mese Febbraio di Time: migliore a giugno

Sporchi Condition: Alcuno suolo contenendo ammontari generosi di materiale organico (bene-decomporsi sterco di vacca, riduca in concime organico, ecc.).

Spacing: il di 2 piedi remano remare 8 " - 10 " tra piante

Profonditŕ per Piantare Seme: 1/2 pollice

Giorni alla Germinazione: 4 - 6

Istruzioni che piantano: Semi di pianta in un seedbox o seedbed. Trapianti quando il giovani pianta sono 4 pollici alti. Giovani pianta possono essere cresciuti su tumuli o letti. Pianta tre giovani pianta per tumulo.

Cura: Tenga il suolo umido. Allacci la pianta ad un bastone. Dia tč di concime ogni settimana per incentivare la crescita di foglia.

Raccogliendo: Cominci a raccogliere quando la vite č tre piedi lunga. Il piů la vite sia tagliato, il piů lo ramifica crescerŕ. Raccolta di seme č facile.

Iuta di (Dolce) <veda; ritratto 18>

Time che pianta: Marzo a maggio

Condizione di suolo: Alcuno suolo contenendo dei materiali organici (il composto, sterco di vacca bene-decomporsi, ecc.)

Spaziando: 3 " - 4 " tra ogni pianta

Profonditŕ per Piantare Seme: 1/4 pollice

Giorni alla Germinazione: 4 - 6

Istruzioni che piantano: Trasmetta sui semi letti bene-preparati. Copra leggermente con suolo, poi innaffi il letto.

Cura: Acuto il suolo umido finché i semi sono germinati. Cominci a diventare calvo quando il piante sono 3 pollici alte. Tenga i letti ripuliti dalle erbacce. Dia tč di concime per promuovere foglia crescita.

Raccogliendo: Cominci a scegliere le foglie 1 mese dopo avere piantato. Gambi possono essere raccolto per fibra dopo 5 mesi. Le foglie sono una fonte buona di vitamine e minerals. Raccolta di seme č facile.

KAKROL <veda; ritratto 19>

Time che pianta: Marzo ad agosto

Condizione di suolo: Alcun suolo preparň bene con sterco di vacca o composto

Spacing: 1 pianta per tumulo 3 - 5 piedi tra tumuli

Profonditŕ per Piantare Radice: 3 pollici

Giorni a Germogliando: 3 - 4

Istruzioni che piantano: Pianti una radice che taglia per tumulo. Pezzi scelti di radice da viti sane, produttive. Piante continueranno a produrre anno dopo anno.

Cura: Metta un ramo di bambů grande nella terra per le viti scalare. Mulching circa la piante prese suolo umiditŕ. e non permette ad erbacce di crescere. Orologio per insetto danno. Spolveri con ceneri, se necessario.

Raccogliendo: Le frutte da Kakrol sono pronte mangiare 3 mesi dopo avere piantato. Raccolto prima che i semi divenuti troppo grande.

KOHLRABI <veda; ritratto 20>

Settembre di Time: che pianta, ottobre Novembre di

Condizione di suolo: Alcun suolo preparň bene con sterco di vacca o composto

Spacing: 10 " - 12 " tra file 4 " - 6 " tra piante

Profonditŕ per Piantare Seme: 1/4 pollice

Giorni alla Germinazione: 4 - 6

Istruzioni che piantano: Semi di pianta in un seedbox o direttamente nel giardino. Trapianto giovani pianta dal seedbox quando le piante sono circa 2 pollici alto.

Cura: Strame i letti per conservare l'umiditŕ di suolo e controllare la crescita di erbacce.

Raccogliendo: Una volta il fondo del gambo č giunto a due o tre pollici in diametro, č pronto raccogliere (2-3 mesi).

Senape di (LAI SHAK) <veda; ritratto 21>

Tempo che pianta: Settembre a dicembre

Condizione di suolo: Alcun suolo ricco in materiali organici (decomporsi sterco di vacca, riduca in concime organico, foglie decomporsi, ecc.)

Spacing: 18 " - 24 " tra file 8 " - 12 " tra piante

Profonditŕ per Piantare Seme: 1/4 " - 1/2 "

Giorni a Germination: 3 - 5

Istruzioni che piantano: Pianti i semi in un seedbox o direttamente nel giardino (in file, o trasmise).

Cura: Se semi sono trasmessi, i giovani pianta dovrebbero essere diventati calvo fuori per sostenere 8 a 12 pollici tra piante. Strame i letti per conservare l'umiditŕ di suolo e controllare il browth di erbacce. Dia fertilizzante liquido (tč di concime) molte volte durante il crescente stagione. Questo incoraggerŕ la crescita piů frondosa.

Raccogliendo: Il vegetale č pronto mangiare fra due mesi dopo avere seminato. Tagli e mangi le foglie esterne spesso prolungare il raccolto. Raccolta di seme č facile.

OKRA <veda; ritratto 22>

Time che pianta: Febbraio a maggio Agosto di ad ottobre

Condizione di suolo: Alcun suolo preparň bene con sterco di vacca o composto. Alcuni giardinieri aggiungono cementi al suolo due a quattro settimane prima di piantare.

Spacing: 24 " - 30 " file di between

18 " - 24 " tra piante

Profonditŕ per Piantare Seme: 1/2 " - 1 "

Giorni alla Germinazione: 5 - 8

Istruzioni che piantano: Semi possono essere piantati direttamente nel giardino. Tenga il suolo umido finché i semi germinano.

Cura: Strame i letti per conservare l'umiditŕ di suolo e controllare la crescita di erbacce.

Raccogliendo: Scelga le frutte di fronte ai semi č troppo grande. Semi di okra essiccati sono buoni mangiare. Li prepari piaccia lenticchie asciutte o fagioli. Raccolta di seme č molto facile.

Pisello di (Cespuglio Type) <veda; ritratto 23>

Time che pianta: Ottobre e novembre

Condizione di suolo: Mescoli molto materiale organico nei letti.

Spacing: 18 " - 24 " tra file 6 " - 8 " tra piante

Profonditŕ per Piantare Seme: 1 pollice

Giorni alla Germinazione: 6 - 10

Istruzioni che piantano: Pianta semina direttamente in letti preparati. Semi o possono essere trasmesso o piantato in linee (le file).

Cura: La molta umiditŕ nel suolo č richiesta per la crescita buon. Molti giardinieri strame i letti. Provveda bastoni corti per sostenere le piante se ebbe bisogno. Piselli sono buono crescere lungo i recinti di un giardino.

Raccogliendo: I bacelli giovani sono pronti raccogliere approssimativamente 7 a 8 settimane dopo avere seminato. Semi di salvataggio quando i bacelli sono asciutti dopo quattro mesi.

Pepper (Caldo) <veda; ritratto 24>

Time che pianta: Marzo a maggio October a dicembre

Condizione di suolo: Alcuno suolo contenendo materiali organici (Bene-decomporsi vacca sterco, riduca in concime organico, foglie decomporsi, ecc.

Spacing: 2 piedi tra file 12 " - 18 " tra piante

Profonditŕ per Piantare Seme: 1/2 pollice

Giorni alla Germinazione: 5 - 10

Istruzioni che piantano: Semi di pianta in un seedbox o seedbed. Alcuni giardinieri mettono a bagno i semi per 12 ore prima di seminare. Trapianti i giovani pianta ad un permanente letto dopo un mese.

Cura: Ombreggi i giovani pianta per i primi 3 a 4 giorni dopo avere trapiantato. Strame i letti per conservare l'umiditŕ di suolo e controllare la crescita di erbacce. Tenga il letti umido per i primi 15 giorni dopo avere trapiantato.

Raccogliendo: Pepi verdi sono 3 a 4 mesi pronti dopo avere piantato. Scelga il pepi completamente maturi per asciugare. Raccolta di seme č facile.

Pigeon il Pisello (ORHAR) <veda; ritratto 25>

Time che pianta: Maggio - giugno

Condizione di suolo: Suolo Sabbioso ricco in material organici riducono in concime organico, decomporsi foglie, concime).

Spacing: 3 piedi tra file 2 - 3 piedi tra piante

Profonditŕ per Piantare Seme: 1 pollice

Giorni alla Germinazione: 3 - 5

Istruzioni che piantano: Semi possono essere piantati su letti o tumuli. Tenga il suolo umido finché i semi germinano. Perché questo vegetale occupa la terra per un tempo lungo, č migliore piantarlo vicino gli orli del giardino, o in luoghi altri circa la casa.

Cura: Alcuni giardinieri misero un strame circa le piante per conservare l'umiditŕ di suolo e controlli la crescita di erbacce.

Raccogliendo: Piante fioriscono quando le svolte di tempo fresco. Bacelli sono pronti per scegliere in dicembre o gennaio. Raccolta di seme č facile.

Pointed la Zucca (PATOL) <veda; ritratto 26>

Time che pianta: Marzo ad agosto

Condizione di suolo: Alcun suolo preparň bene con sterco di vacca o composto.

Spacing: 1 pianta per tumulo 3 - 5 piedi tra tumuli

Profonditŕ per Piantare Radice: 3 pollici

Giorni a Germogliando: 3 - 4

Istruzioni che piantano: Pianti una radice che taglia per tumulo. Pezzi scelti di radice da viti sane, produttive. Piante continueranno a produrre anno dopo anno.

Cura: Metta un ramo di bambů grande nella terra per le viti scalare. Mulching circa la piante prese suolo umiditŕ, e non permette ad erbacce di crescere. Guardi per danno di insetto. Spolveri con ceneri, se necessario.

Raccogliendo: Le frutte da Patol sono pronte mangiare 2 mesi dopo avere piantato. Raccolga di fronte ai semi divenuti troppo grande.

Ravanello di <veda; ritratto 27>

Time che pianta: Luglio a dicembre

Condizione di suolo: Allenti, suolo sabbioso materiale organico che contiene (decomporsi sterco di vacca, riduca in concime organico, ecc.).

Spacing: 8 " - 10 " tra file 3 " - 4 " tra piante

Profonditŕ per Piantare Seeds: 1/4 " - 1/2 "

Giorni alla Germinazione: 3 - 4

Istruzioni che piantano: I semi possono essere trasmessi o possono essere piantati in file. Alcuni boardcast dei giardinieri semina spessamente, e raccoglie le piante piccole come un frondoso vegetale.

Cura: Tenga i letti umido e libero di erbacce. Guardi per insetto danneggia sul foglie. Spolveri con ceneri, se necessario.

Raccogliendo: Le foglie sono pronte raccogliere 15 a 20 giorni dopo avere piantato. Il radice č pronta mangiare 2 a 3 mesi dopo avere piantato. Cresca questo vegetale come un raccolto " " rapido per le foglie.

Ridge la Zucca <veda; ritratto 28>

Time che pianta: Marzo, aprile, maggio

Condizione di suolo: Mescoli molto materiale organico nel suolo (sterco di vacca, riduca in concime organico, ecc.

Spacing: 2 - 3 semi per tumulo 2 - 3 piedi tra tumuli

Profonditŕ per Piantare Seme: 1/2 " - 1 "

Giorni a Germination: 7 - 10

Istruzioni che piantano: Pianti quattro a cinque semi su un tumulo. Piů tardi, rimuova tutti ma le tre piante che guardano piů forti.

Cura: Cresca su un graticcio o metta un ramo di bambů grande nella terra per le viti scalare. All'inizio puň essere necessario per allacciare le viti all'appoggio.

Raccogliendo: Le zucche sono pronte per mangiare 10 a 12 settimane dopo avere piantato. Tenga zucche scelte via le viti per prolungare il raccolto. Raccolta di seme č facile.

Serpente Zucca <veda; ritratto 29>

Time che pianta: Marzo, aprile, maggio

Condizione di suolo: Mescoli molto materiale organico nel suolo (sterco di vacca, riduca in concime organico, ecc.)

Spacing: 2 - 3 giovani pianta per tumulo 2 - 3 piedi tra tumuli

Profonditŕ per Piantare Seme: 1/4 " - 1 "

Giorni alla Germinazione: 7 - 10

Istruzioni che piantano: Pianti quattro a cinque semi su un tumulo. Piů tardi, rimuova tutti ma le tre piante che guardano piů forti.

Cura: Metta un ramo di bambů grande nella terra per le viti scalare. Nel cominciarlo puň essere necessario per allacciare le viti all'appoggio.

Raccogliendo: Le zucche sono pronte per mangiare 3 a 4 mesi dopo avere piantato. Scelta le zucche spesso prolungare il raccolto. Raccolta di seme č facile.

Spinacio di <veda; ritratto 30>

Settembre di Time: che pianta a dicembre

Condizione di suolo: Mescoli molto materiale organico nei letti.

Spacing: 6 " - 8 " tra file 6 " tra piante

Profonditŕ per Piantare Seme: 1/2 "

Giorni alla Germinazione: 3 - 7

Istruzioni che piantano: Metta a bagno i semi per 12 ore. Semini in file o trasmissione il seme sulla cima di un letto. Tenga il letto umido finché i semi germinano.

Cura: Molto strame di giardinieri i letti per preservare l'umiditŕ e tenere le erbacce da crescendo. Dia fertilizzante liquido (tč di concime) ogni settimana durante il crescente stagione.

Raccogliendo: Le prime foglie saranno pronte raccogliere quattro a cinque settimane dopo seminando. Tagli le foglie esterne per prolungare il raccolto spesso. Raccolta di seme č facile. Mais Dolce <veda; ritratto 31>

Time che pianta: Settembre a novembre February a giugno

Condizione di suolo: Suolo Sabbioso ricco in materiali organici (il composto, bene-decomporsi concimi, ecc.)

Spaziando: 2 piedi tra file 6 pollici tra piante

Profonditŕ per Piantare Seme: 1 pollice

Giorni alla Germinazione: 4 - 6

Istruzioni che piantano: Pianta semina direttamente nel giardino. Prepari i letti con molto sterco di vacca bene-decomporsi e riduce in concime organico,

Cura: Molto strame di giardinieri i letti per conservare l'umiditŕ di suolo e sopprimere erbacce. Esso mais non cresce bene, forse il suolo č acido. Questo puň essere corretto da aggiungendo polverizzato cementa (il chun) al suolo.

Raccogliendo: Raccolga il mais quando i noccioli ancora sono molli e lattei. Seme raccolta č facile.

Patata Dolce (VINING Type) <veda; ritratto 32>

Time che pianta:

Per Tuberi: Ottobre - novembre Per Foglie: Alcun mese

Condizione di suolo: Suolo Sabbioso, sciolto contenendo alcuni bene-decomporsi concime + composto

Spacing: 2 piedi tra file 8 " - 10 " tra piante

Istruzioni che piantano: Pianti usando il tagli di vite di 1S pollice. I tagli al punta č la meglio. Pianti il taglio ad un angolo, cosě che mezzo (o due-terzo) č sotto la terra, lasciando il resto del gambo e punta di vite sopra della terra. Se tagli di vite non sono disponibili, tagli un tubero che germoglia in sezioni e pianta i pezzi che lasciano i germogli sopra della terra.

Cura: Rimuova una volta o due volte settimane finché le viti coprono i letti.

Raccogliendo: Le il punte di vite di sei pollice fanno un vegetale eccellente, ricco in vitamine e minerals. Raccolga le punte circa l'anno. Tuberi sono pronti raccogliere 5 a 6 mesi dopo avere piantato. Permetta loro di guarire (il resto) in un luogo aperto ma coperto per una settimana prima di mangiare.

Zucca Dolce (Schiacci) <veda; ritratto 33>

Time che pianta: Agosto a novembre

Condizione di suolo: Alcuno suolo contenendo ammontari generosi di organico materiale (sterco di vacca, riduca in concime organico, decomporsi foglie)

Spacing: 2 piante per tumulo 3 piedi tra tumuli

Profonditŕ per Piantare Seme: 1 pollice

Giorni alla Germinazione: 4 - 10

Istruzioni che piantano: Pianti cinque a sei semi su un tumulo. Quando i giovani pianta č su, rimuova tutti ma le due piante migliori.

Cura: Zucca dolce puň essere cresciuta su letti di mulched, o su un graticcio per salvare spazio. Cause che finito-annaffiano foglie eccessive e meno la frutta. Se le foglie anche divenute molti, pizzichi via le punte della vite.

Raccogliendo: Foglie e punte di Gambo possono essere raccolte dopo due mesi. Frutte sono pronto nei nostri mesi. Raccolta di seme č facile.

Spada Fagiolo (MAKHON SHEEM) <veda; ritratto 34>

Time che pianta: Luglio, agosto Settembre di